



NYHED

VETORYL®

Nu også i dobbelt delbare tabletter

Ved hjælp af delbare tabletter kan dosis fastsættes i intervaller på 2,5 mg, begyndende fra 5 mg.

Smag af kylling, hydrolyseret



6 kapselstyrker

Originalt produkt



Dechras støtte og ekspertise inden for endokrinologi i over 20 år.
For dig, for dine patienter.




Dechra

VETORYL®

Trilostan

TIL HUNDE:

Til behandling af hypofysær- og adrenal-betinget hyperadrenocorticisme (Cushings syndrom). Vetoryl® forbedrer ikke kun hundens livskvalitet, men hjælper også med at forlænge dens forventede levetid betydeligt¹.



Hæmmer steroidogenesis selektivt og reversibelt, reducerer kortisolniveauet og lindrer de kliniske symptomer på Cushings syndrom.



Vælg delbare tabletter eller kapsler afhængigt af patientens og ejerens behov.



Administreres i forbindelse med måltider én eller to gange dagligt.



+ Vetoryl kapsler

- Originalt produkt
- Med over 20 års dokumenteret brugserfaring
- Hårde gelatinekapsler med en elfenbenshvid underdel og en sort overdel, påtrykt kapselstyrken på underdelen af kapslen.
- 5, 10, 20, 30, 60 og 120 mg (pakningsstørrelse 30 kapsler)

+ Dosering

- Startdosis for behandling er ca. **2 mg/kg**, indgives **en gang dagligt** sammen med mad
- Efterfølgende doser og administrationsintervallet afhænger af det kliniske respons og laboratoriekontroller
- Hvis symptomerne ikke er tilstrækkeligt kontrollerede i en hel 24-timers periode mellem doserne, skal du overveje at dele den ligeligt mellem morgen og aftendosis.

+ Vetoryl tyggetabletter

- De **dobbelt-delbare tabletter** giver en fleksibel og præcis behandlingsmulighed for Cushings patienter
- Ved hjælp af de **delbare tabletter**, kan dosis fastsættes i intervaller på 2,5 mg, begyndende fra 5 mg.
- Tabletterne kan nemt **deles i to eller fire dele**, hvilket er med til at sikre den korrekte dosering
- Tabletterne har **kyllingesmag** for at forbedre compliance (hydrolyseret)
- 20, 30 og 60 mg (pakningsstørrelse 30 tabletter)

Dechras støtte og ekspertise inden for endokrinologi i over 20 år. For dig, for dine patienter.

+ DOSERINGSTABEL for en daglig dosis på 2 mg/kg

	TABLET	20 mg		30 mg		60 mg		KAPSEL	5 mg		10 mg		20 mg		30 mg		60 mg		120 mg
Vægt (kg)	Daglig dosis							Daglig dosis											
3	5 mg							5 mg											
5	10 mg							10 mg	 eller 										
7,5	15 mg		eller		eller			15 mg	 og 										
10	20 mg							20 mg			 eller 								
15	30 mg	 og 	eller		eller			30 mg			 og 	eller		eller					
20	40 mg	 og 						40 mg					 og 						
30	60 mg	 og  og 	eller	 og 	eller			60 mg					 og  og 	eller	 og 	eller			
40	80 mg	 og  og  og 	og	→				80 mg					 og  og  og 	og	→				
60	120 mg					 og 		120 mg								 og 	eller		

+ DOSERINGSTABEL for en specifik dosis i mg

De doser, der er anført i denne tabel, er kun forslag for at fremhæve alternativer til dosering med tabletter. Det nøjagtige valg af dosering skal bestemmes af den behandlende dyrlæge i henhold til den enkelte patients behov.

Det er muligt at opnå alle doser i trin på 2,5 mg ved at kombinere de forskellige tabletstyrker (startende fra 5 mg).

VETORYL® tyggetablet	20 mg	30 mg	60 mg
Dosis (mg)			
5 mg			
7,5 mg			
10 mg			
12,5 mg	 og 		
15 mg			
17,5 mg	 og 		
20 mg			
22,5 mg			
25 mg	 og 		
27,5 mg	 og 		
30 mg	eller		
32,5 mg	 og 		
35 mg	 og 		
37,5 mg	eller	 og 	

VETORYL® tyggetablet	20 mg	30 mg	60 mg
Dosis (mg)			
37,5 mg		 og 	
40 mg	 og 		
42,5 mg	 og  og 		
45 mg			
47,5 mg	 og  og 		
50 mg	 og 		
55 mg	 og  og 		
60 mg			
75 mg			 og 
90 mg			 og 
120 mg			 og 

Du har vores støtte og ekspertise indenfor endokrinologi

Cushings syndrom er en af de mest almindeligt diagnosticerede endokrinopati hos hunde, men hvis du ikke støder på tilfælde regelmæssigt, kan du have brug for støtte. Vi er her for at hjælpe. Med 20 års erfaring er Dechra her for at støtte dig i håndteringen af Cushings syndrom hvert skridt på vejen.



Dechra Academy

Gratis onlinekurser, som du kan tage i dit eget tempo, herunder interaktiv træning i diagnosticering, behandling og håndtering af Cushings syndrom.



Dechra endocrinology App

Unik gratis app til at vejlede dig i diagnosticering, behandling og monitorering af dine patienter. Tilgængelig på Google Play og App Store.



Cushing's Connect

Hjemmesiden tilbyder moduler om Cushings diagnose, behandling, monitorering og klientkommunikation sammen med et materialebibliotek med brochurer, videoer og ofte stillede spørgsmål.



Support til kæledyrsejere:

Cushings hjemmeside og en gratis app til at monitorere deres kæledyrs fremskridt derhjemme. Tilgængelig på Google Play og App Store.



Dechra Cushing's Monitoring App

Den gratis Dechra Cushing's Monitoring App forenkler håndteringen af Cushing's for hundeejere ved at forbedre overholdelse af medicinering, tilbyde skræddersyede medicinpåmindelser og fremme engagement i hundepåse. Ejeren kan nemt spore symptomer og registrere kliniske resultater og livskvalitet. Søg på "Cushing's Monitoring" i Apple App Store eller Google Play Store for at downloade.

Nogle patienttilfælde kan være komplekse, så hvis du har brug for råd, er vores tekniske supportteam her for at hjælpe med alle Vetoryl-relaterede cases. Kontakt os gerne: ✉ technical.nordic@dechra.com

Reference

¹ Nagata N, Kojima K, Yuki M (2017), Comparison of Survival Times for Dogs with Pituitary-Dependent Hyperadrenocorticism in a Primary-Care Hospital: Treated with Trilostane versus Untreated, J Vet Int Med 31(1): 22-28

Vetoryl kapsler og tyggetabletter til hund. 20 mg, 30 mg, 60 mg (tyggetabletter), 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg (hårde kapsler). **Aktivt stof:** Trilostan. Rx. **ATCvet-kode:** QH02CA01. **Dyrearter:** Hund. **Indikationer:** Til behandling af hypofysær- og adrenal-betinget hyperadrenocorticisme (Cushings syndrom). **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til dyr, som lider af primær leversygdom og/eller nyreinsufficiens, ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne eller til hunde, der vejer under 3 kg (gælder for tyggetabletter samt ved kapsler 5, 10, 20 og 30 mg), under 10 kg (hvis kapsler 60 mg), under 20 kg (hvis kapsler 120 mg). **Særlige forsigtighedsregler:** Det er yderst vigtigt at stille en præcis diagnose for hyperadrenocorticisme (HAC). Ved manglende respons på behandling bør diagnosen revurderes. Dosisøgning kan være nødvendig. Hunde med HAC har øget risiko for pankreatitis. Det er ikke sikkert, at denne risiko reduceres ved trilostanbehandling. Da de fleste tilfælde af HAC forekommer hos hunde mellem 10-15 år, vil der ofte også være andre patologiske tilstande. Det er især vigtigt at undersøge for primær leversygdom og nyreinsufficiens, da produktet er kontraindiceret i disse tilfælde. Der kræves tæt overvågning under behandlingen, inklusive leverenzym, elektrolytter, urinstof og kreatinin. Ved samtidig forekomst af diabetes mellitus og HAC kræves særlig opfølgning. Hvis patienten tidligere er behandlet med mitotan, bør SPC læses inden brug. Produktet bør anvendes med stor forsigtighed til hunde med anæmi, da yderligere reduktion i hæmatokrit og hæmoglobin kan forekomme. Hundene bør kontrolleres regelmæssigt for primær leversygdom, nyresygdom og diabetes. Tyggetabletterne er smagstilpassede. For at undgå utilsigtet indtagelse skal tabletterne opbevares uden for dyrets rækkevidde. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Trilostan kan mindske syntesen af testosteron og har anti-progesteron-egenskaber. Gravide kvinder eller kvinder, der forsøger at blive gravide, bør undgå håndtering af lægemidlet. Vask hænderne efter brug. Kapslerne må ikke deles eller åbnes. Hvis en kapsel går i stykker og kommer i kontakt med hud eller øjne, skal der straks skylles med rigelige mængder vand. Ved vedvarende irritation kontaktes læge, og pakningsvedlægget eller etiketten vises. Personer med kendt overfølsomhed overfor indholdsstofferne bør undgå kontakt med produktet. Opbevares i originalemballagen og utilgængeligt for børn. Kontakt straks læge ved utilsigtet indtagelse og vis etiketten eller pakningsvedlægget, da bivirkninger som opkastning eller diarré kan forekomme. **Bivirkninger:** Mindre almindelige: Lethargi, anoreksi, opkastning, diarré. Sjældne: Hypoadrenocorticisme (inkl. Addisons krise), hypersalivation, oppustethed, ataksi, muskelsvaghed, hudforandringer, nyreinsufficiens og arthritis (afdækket på grund af nedsatte endogene kortikosteroider), svaghed. Meget sjældne: Adrenal nekrose, pludselig død. For yderligere detaljer se SPC. Kortikosteroid-abstinenssyndrom og hypokortisolæmi bør skelnes fra hypoadrenocorticisme ved evaluering af serumelektrolytter. **Brug til avlsdyr, drægtige eller diegivende tæver:** Må ikke anvendes til avlsdyr, drægtige eller diegivende tæver. **Interaktion med andre lægemidler og øvrige interaktioner:** Muligheden for interaktion med andre lægemidler er ikke undersøgt specifikt. Da HAC ofte forekommer hos ældre hunde, vil mange få samtidig anden medicin. Der er ikke observeret interaktioner i kliniske studier. Risikoen for hyperkaliæmi bør vurderes, hvis trilostan anvendes sammen med kaliumsparende diuretika eller ACE-hæmmere. Ved samtidig brug skal en risiko/nyttevurdering foretages, da dødsfald (herunder pludselig død) er rapporteret hos hunde behandlet med trilostan og en ACE-hæmmer. **Dosering og indgivelsesmåde:** Til oral anvendelse. Startdosis er ca. 2 mg/kg. Administreres én gang dagligt sammen med foder. Hundens vægt skal bestemmes så nøjagtigt som muligt for at sikre korrekt dosering. Dosis titreres i henhold til den individuelle respons (se SPC). Hvis symptomerne ikke kontrolleres tilfredsstillende i hele 24-timers perioden mellem to doser, kan det overvejes at øge den samlede dagsdosis med op til 50 % og dele den ligeligt i en morgen- og en aften-dosis. Et fåtal af hunde kræver doser, der overstiger 10 mg/kg/dag. I sådanne tilfælde bør passende kontrolforanstaltninger tages. Dosisjustering kan være nødvendig ved skift mellem Vetoryl hårde kapsler og Vetoryl tyggetabletter, da fuld udskiftelighed mellem lægemiddelformerne ikke kan garanteres på grund af individuelle forskelle i respons. **Pakningsstørrelser:** Blisterkarton med 3 blistere. Hver blister indeholder 10 tabletter eller kapsler. **Indehaver af markedsføringsret:** Dechra Regulatory B.V. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for sidste ændring:** 26.08.2019 (kapsler), 15.03.2006 (tyggetabletter). **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af produktresuméet. For yderligere information se www.vetisearch.dk eller www.dechra.dk. Dagsaktuel pris findes på www.vetisearch.dk.**