

# Cardisan Vet.

pimobendan 1,25 - 2,5 - 5 - 10 mg  
tabletter



## Egenskaber

**Cardisan Vet** har en positiv inotrop virkning og udtalte vasodilaterende egenskaber.

Den positive inotrope effekt af pimobendan formidles gennem øget følsomhed over for calcium i hjerte-myofilamenterne og hæmning af fosfodiesteraseaktiviteten (type III). Den vasodilaterende effekt opstår ved hæmning af fosfodiesterase III.

## Dyrearter

Hund.

## Indikationer

Til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens hos hunde, der stammer fra dilateret kardiomyopati eller valvulær insufficiens (mitral- og/eller triscupidal).

## Dosering/indgivelse

0,2 mg til 0,6 mg/kg PO, opdelt i to daglige doser.

Den foretrukne daglige dosis er 0,5 mg/kg, der gives i to daglige doser (0,25 mg/kg). Hver dosis skal gives ca. 1 time før fodring.

| Hundens vægt (kg) | Cardisan Vet |             |             |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|                   | Tabletstyrke | Morgendosis | Aftendosis  |
| 5                 | 1,25 mg      | 1 tablet    | 1 tablet    |
| 10                | 2,5 mg       | 1 tablet    | 1 tablet    |
| 15                | 2,5 mg       | 1,5 tablet  | 1,5 tablet  |
| 20                | 5 mg         | 1 tablet    | 1 tablet    |
| 30                | 5 mg         | 1,5 tablet  | 1,5 tablet  |
| 40                | 10 mg        | 1 tablet    | 1 tablet    |
| 50                | 10 mg        | 1,25 tablet | 1,25 tablet |
| 60                | 10 mg        | 1,5 tablet  | 1,5 tablet  |

## Pakningsstørrelse

1,25 mg: 10 x 10 tabletter (Vnr 59 88 27)

2,5 mg: 10 x 10 tabletter (Vnr 05 81 26)

5 mg: 10 x 10 tabletter (Vnr 13 22 23)

10 mg: 10 x 10 tabletter (Vnr 57 17 53)

Se bagsiden for mere information.



**salfarm**  
www.salfarm.com

# Cardisan Vet.

pimobendan 1,25 - 2,5 - 5 - 10 mg  
tabletter

## Dyrearter

Hund.

## Indikation

Kongestiv hjereteinsufficiens hos hunde, der stammer fra dilateret kardiomyopati eller valvulær insufficiens (mitral/triscupidal).

## Dosering

0,2 mg til 0,6 mg pimobendan/kg PO, opdelt i to daglige doser. Den foretrukne daglige dosis er 0,5 mg/kg, der gives i to daglige doser (0,25 mg/kg). Hver dosis skal gives ca. 1 time før fodring af dyret.

## Overdosering

Positiv kronotrop effekt, opkastning, apati, ataksi, hjertemislyde, hypotension, mitralklapfortykkelse, ventrikelhypertrof.

## Kontraindikationer

Hypertrofiske kardiomyopier, tilstande hvor en forbedring af hjerterolumen ikke er mulig af funktionelle eller anatomiske årsager (f.eks. aorta-stenose). Overfølsomhed over for det aktive stof/hjælpestoffer.

## Bivirkninger

Opkast, diarré, anoreksi, sløvhed, øget hjerterefrekvens, forøgelse af mitralklap regurgitation. Primær hæmostase, petekkier på slimhinder, subkutane blødninger.

## Interaktion

Farmakologiske undersøgelser har ikke vist interaktion mellem hjerateglykosidet strophanthin og pimobendan. Den inducerede forøgning i hjertets kontraktilitet svækkes af calciumantagonister og beta-antagonister.

## Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Der bør laves en regelmæssig test af blodsukkeret ved eksisterende diabetes mellitus. Bør ikke anvendes ved alvorlig nedsat leverfunktion. Monitorering af hjerterefunktion og morfologi under behandling anbefales. For at undgå utilsigtet indtagelse skal tabletterne opbevares utilgængeligt for dyr. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Kan forårsage takykardi, ortostatisk hypotension, rødme i ansigt og hovedpine. Ubrugte tablettele skal lægges tilbage i blisterpakningen og kartonen, og opbevares utilgængeligt for børn. Delvist brugte tabletter kan bruges til næste dosis. Ved utilsigtet indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen/etiketten vises til lægen. Vask hænder efter brug.

## Drægtighed og diegivning

Drægtighed: Der er ikke tegn på teratogene eller føtotoksiske virkninger. Der er fundet tegn på maternotoksiske og embryotoksiske virkninger ved høje doser. Sikkerheden af produktet er ikke blevet undersøgt hos drægtige tæver. Må kun anvendes i overensstemmelse med benefit/risk-forholdet. Diegivning: Pimobendan udskilles i mælken. Sikkerheden af produktet er ikke blevet undersøgt hos diende tæver. Må kun anvendes i overensstemmelse med benefit/risk-forholdet.

## Pakningsstørrelse:

1,25 mg: 10 x 10 tabletter  
2,5 mg: 10 x 10 tabletter  
5 mg: 10 x 10 tabletter  
10 mg: 10 x 10 tabletter

## Udleveringsgruppe: B

**Pris:** For dagsaktuel pris se [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk)

## Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Utrecht, Holland

Fuldstændigt produktresumé kan ses på [www.produktresume.dk](http://www.produktresume.dk) eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: [info@salfarm.com](mailto:info@salfarm.com)

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.