

Benadil® Vet.

benazepril 5 & 20 mg

tabletter



Egenskaber

- **Benadil® Vet.** er en yderst potent og selektiv ACE-hæmmer.
- **Benadil® Vet.** giver langvarig hæmning af ACE-aktiviteten i plasma.
- **Benadil® Vet.** sænker blodtrykket og hjertets fyldningsgrad.
- **Benadil® Vet.** normaliserer det forhøjede glomerulære kapillærtryk og reducerer blodtrykket hos kat. Mindsket glomerulær hypertension kan nedsætte progressionen af nyresygdom ved at forhindre yderligere skader på nyrerne.
- Kliniske studier på katte med kronisk nyresygdom har vist, at benazepril signifikant reducerer niveauet af protein i urinen samt protein/kreatinin-forholdet (UPC).
- To forskellige farver til forskellige styrker – for sikker administration.
- Små tabletter – nem administration.

Dyrearter

Hund (5 & 20 mg tabletter)

Kat (5 mg tabletter)

Indikationer

Hund: Behandling af kongestiv hjerteinsufficiens.

Kat: Reduktion af proteinuri i forbindelse med kronisk nyresygdom.

Dosering/indgivelse

Hund: 0,25 - 0,5 mg/kg PO én gang dagligt med eller uden foder.

Dosen kan fordobles og stadig administreres én gang dagligt, hvis det vurderes klinisk nødvendigt.

Kat: 0,5 - 1 mg/kg PO én gang dagligt med eller uden foder

Pakningsstørrelse

5 mg: 2 x 14 tabletter (Vnr 43 13 11)

7 x 14 tabletter (Vnr 42 97 68)

20 mg: 2 x 14 tabletter (Vnr 19 17 99)

7 x 14 tabletter (Vnr 51 17 71)

Se bagsiden for mere information.



salfarm
www.salfarm.com

Kardiologi

Benadil® Vet.

benazepril 5 & 20 mg
tabletter

Indikation

Hund (5 & 20 mg tabletter): Behandling af kongestiv hjersteinsufficiens.
Kat (5 mg tabletter): Reduktion af proteinuri i forbindelse med kronisk nyresygdom.

Dosering

Hund: 0,25 - 0,5 mg/kg PO én gang dagligt med eller uden foder. Dosen kan fordobles og stadig administreres én gang dagligt til en minimumsdosis på 0,5 mg/kg (interval 0,5-1,0), hvis det vurderes klinisk nødvendigt og anbefales af dyrlægen.

Kat: 0,5 - 1 mg/kg PO én gang dagligt med eller uden foder

Overdosering

Reducering af erytrocyttallene, forbigående reversibel hypotension

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof/hjælpestoffer, hypotension, hypovolemie, hyponatriæmi eller akut nyresvigt. Nedsat cardiac output på grund af aorta- eller pulmonalstenose. Drægtighed eller laktation.

Bivirkninger

Hund: Opkastning, træthed, forhøjet kreatinin, manglende koordineringsevne.

Kat: Diarre, opkastning, anoreksi, dehydrering, letargi, forhøjet kreatinin, øget appetit, vægtstigning.

Interaktion

Kombinationen med NSAID kan føre til reduceret antihypertensiv virkning eller nedsat nyrefunktion. Kombinationen med andre antihypertensiva, anæstetika eller sedativer kan føre til øgede hypotensive virkninger. Interaktioner med kaliumbesparende diuretika kan ikke udelukkes. Det anbefales at overvåge kaliumniveauer i plasma, når veterinærlægemidlet anvendes i kombination med et kaliumbesparende diuretika.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Der er ikke observeret tegn på nyretoksicitet ved brug af veterinærlægemidlet i kliniske forsøg. Som det er rutine i tilfælde af kronisk nyresygdom, anbefales det at plasmakreatinin, urea og erytrocyttal overvåges under behandlingen. Virkning og sikkerhed ved en legemsvægt under 2,5 kg er ikke fastlagt. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Ved overfølsomhed over for benazeprilhydrochlorid bør kontakt undgås. Gravide kvinder skal udvise særlig forsigtighed. For at undgå utilsigtet indtagelse, især af et barn, skal ubrugte deltabletter lægges tilbage i blisterpakningen, som lægges tilbage i æsken. I tilfælde af oral indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen/etiketten vises til lægen. Vask hænder efter brug. Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring: Opbevares under 25°C (5 mg) eller 30°C (20 mg). Opbevares tørt. Ubenyttede halve tabletter lægges tilbage i blisterpakningen, som lægges tilbage i kartonæsken, og bruges ved den næste administration.

Drægtighed og diegivning

Må ikke anvendes.

Pakningsstørrelse:

5 mg: 2 x 14 tabletter
7 x 14 tabletter

20 mg: 2 x 14 tabletter
7 x 14 tabletter

Holdbarhed

Uåbnet: 2 år (5 mg) og 3 år (20 mg).

Delte tabletter: 2 dage.

Udleveringsgruppe: B

Pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen

VetViva Richter GmbH

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.