


Robexera Vet.

robenacoxib 5, 10, 20, 40 mg
tyggetabletter



- Velkendt og velafprøvet COX-2-selektiv substans
- Høj sikkerhedsmargin⁴
- Effektiv mod både smerte og inflammation⁴
- Koncentreres i inflammatorisk væv³
- Nem dosering
- Konkurrencedygtig pris

salfarm
www.salfarm.com

Optimer din smertebehandlingsprotokol med Robexera Vet.



Robenacoxibs korte halveringstid i blodbanen og høje vævsselektivitet gør, at det – i kraft af sin egenskab som svag syre – binder sig til inflammationsstedet og hurtigt elimineres fra blodbanen. Dette skåner velfungerede organer såsom lever, nyrer og mave-tarmkanal^{1,2}



Robenacoxib giver målrettet smertelindring – opnår hurtigt maximal koncentration og forbliver længere ved inflammationsstedet end i blodet, takket være sin selektive distribution til inflammatorisk eksudat^{1,3}



Robenacoxib forbliver ved inflammationsstedet og giver effektiv smertelindring i op til 24 timer⁴



Nem at administrere.
Lille, velsmagende tablet, der gives uden foder⁵

Osteoarthritis

1-2 mg/kg dagligt,
se tabellen nedenfor.

Kropsvægt (kg)	Antal tabletter efter styrke			
	5 mg	10 mg	20 mg	40 mg
2,5 til < 5	1 tablet			
5 til < 10		1 tablet		
10 til < 20			1 tablet	
20 til < 40				1 tablet
40 til 80				2 tabletter

Bløddelskirurgi

2-4 mg/kg dagligt i op til 3 dage,
se tabellen nedenfor.

Kropsvægt (kg)	Antal tabletter efter styrke			
	5 mg	10 mg	20 mg	40 mg
2,5	1 tablet			
> 2,5 til < 5		1 tablet		
5 til < 10			1 tablet	
10 til < 20				1 tablet
20 til < 40				2 tabletter
40 til < 60				3 tabletter
60 til 80				4 tabletter

Indikation: Til behandling af smerter og inflammation ved kronisk osteoarthritis og bløddelskirurgi. **Dosering:** : Administeres uden foder eller mindst 30 minutter før eller efter et måltid. Tabletterne er tilsat smag. Osteoarthritis: 1-2 mg/kg PO. Bløddelskirurgi: 2-4 mg/kg PO. **Overdosering:** Hos raske unge hunde på 5-6 måneder i store overdoser er der ikke observeret tegn på toksicitet, gastrointestinal toksicitet, nyre- eller levertoksicitet eller effekt på blødningstid eller skadelige virkninger på bindevæv eller led. Ved blandingsracer med overdoser på op til 3 gange den maksimalt anbefalede dosis observeredes inflammation, øget blodtilførsel eller blødning i duodenum, jejunum og cecum. Der blev ikke set nogen relevant påvirkning af legemsvægt, blødningstid eller tegn på nyre- eller levertoksicitet. **Kontraindikationer:** Mavesår, leversygdom, må ikke anvendes samtidig med kortikosteroider eller andre NSAIDs, overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne, drægtige og diegivende dyr. **Bivirkninger:** Gastrointestinale bivirkninger, opkastning, blød fæces, nedsat appetit, diarré, forhøjede leverenzymmer, blod i fæces, opkastning, tab af appetit, apati, letargi. **Interaktion:** Administer ikke samtidig med andre NSAID'er eller glukokortikoider. Ved samtidig behandling med lægemidler, der påvirker det renale flow som f.eks. diuretika eller ACE-hæmmere, bør der monitoreres klinisk. Samtidig administration af potentielt nyretoksiske stoffer bør undgås. Samtidig brug af andre aktive stoffer, der har en høj grad af proteinbinding, kan føre til toksiske effekter. **Særlige advarsler:** I kliniske studier er der set utilstrækkeligt respons hos 10-15 % af patienter. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Sikkerhed er ikke fastlagt for hunde, der vejer under 2,5 kg eller er under 3 måneder gamle. Ved langtidsbehandling skal leverenzymmer monitoreres nogle gange kort efter starten af behandlingen. Derefter anbefales det at fortsætte med regelmæssig monitorering. Behandlingen skal seponeres, hvis aktiviteten af leverenzymmer stiger markant, eller hvis hunden viser tegn på bivirkninger. Anvendelse til hunde med nedsat hjerte- eller nyrefunktion eller til hunde, der er dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive, kan indebære yderligere risici. Ved anvendelse af lægemidlet til hunde med risiko for mavesår, eller til hunde, der tidligere har udvist intolerance over for andre NSAID'er, er nøje tilsyn påkrævet. Tabletterne er tilsat smag og skal derfor opbevares utilgængeligt for dyr. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Hos gravide kvinder, især dem, der er tæt på terminen, øger forlænget hudkontakt risikoen for præmatur lukning af ductus arteriosus hos fostret. Gravide kvinder skal udvise forsigtighed! Utilsigtet indtagelse øger risikoen for bivirkninger som følge af NSAID, særligt hos små børn. Derfor skal tabletter ikke udtages af blisterkortet før de skal gives til dyret og skal håndteres og opbevares i den originale emballage utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlæggssedlen/etiketten fremvises. Vask hænderne efter brug. **Drægtighed og diegivning:** Må ikke anvendes under drægtighed og diegivning (sikkerhed ikke fastlagt). Må ikke anvendes til avlsdyr. **Pakningsstørrelse:** 3 x 10 tabletter. **Udleveringsgruppe:** B **Pris:** For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk **Indehaver af markedsføringstilladelsen** Krka, d.d., Novo mesto .

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.
Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 7550 8080, Email: info@salfarm.com

Kilder:

- Kongara K, and John PC. "Robenacoxib in the treatment of pain in cats and dogs: safety, efficacy, and place in therapy." Veterinary medicine (Auckland, N.Z.) vol. 9 53-61. 15 Aug. 2018. doi:10.2147/VMR. S170893.
- Silber HE, Burgener C, Letellier IM, et al (2010). Population pharmacokinetic analysis of blood and joint synovial fluid concentrations of robenacoxib from healthy dogs and dogs with osteoarthritis. Pharm Res (2010): 27:2633-45. doi: 10.1007/s11095-010-0262z.
- Lees, P, Toutain PL, Elliott, J, Giraudel, JM, Pelligand L, King JN. (2022). Pharmacology, safety, efficacy and clinical uses of the COX-2 inhibitor robenacoxib. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 45, 325-51. <https://doi.org/10.1111/jvp.13052>.
- Pascoe J. Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats (Second Edition). Anesthesia and pain management (2020) 22-43.e1, doi: 10.1016/B978-0-7020-7675-6.00013-9.
- Robexera vet SmPC.