

NYE DK-registreringer!
Udleveringstilladelse ikke længere nødvendig.

Cefenicol, øjendråber

Chloramphenicol 5 mg/ml



Behandling af bakterielle øjeninfektioner som f.eks.

- Conjunctivitis
- Keratitis
- Dacryocystitis
- Blepharitis

Cefenidex, øjendråber

Chloramphenicol 2 mg/ml
Dexamethason 1 mg/ml



Behandling af inflammatoriske og allergiske øjenlidelser som f.eks.

- Conjunctivitis
- Keratitis
- Mild iritis
- Inflammation i tåresækken, forbundet med bakterielle infektioner

OBS! Opbevares på køl

ScanVet



Cefenicol

Øjendråber, opløsning til katte og hunde.

Aktivt stof:

Chloramphenicol: 5,0 mg/ml.

Terapeutiske indikation:

Behandling af bakterielle øjeninfektioner som f.eks. conjunctivitis, keratitis, dacryocystitis og blepharitis.

Dosering og indgivelsesmåde:

Okulær anvendelse.
1 dråbe (1 dråbe indeholder 0,15 mg chloramphenicol) i konjunktivalsækken på det berørte øje eller om nødvendigt i begge øjne 6-8 gange dagligt i starten af behandlingen, derefter 4-6 gange dagligt. Svære tilfælde kan kræve hyppigere dosering (1 dråbe hver eller hver anden time) i de første 24-48 timer. Behandlingen bør fortsætte i 2 dage efter symptomerne er aftaget.

Overdosering:

Ved lokal anvendelse er overdosering meget usandsynlig.

Kontraindikationer:

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler:

Inden behandlingen påbegyndes skal det sikres, at øjeninflammationen ikke skyldes mekaniske eller fysiske årsager, fx ektopisk cilie, entropion, fremmedlegemer, eller mangel på tåresekretion. Der er påvist krydsresistens mellem chloramphenicol og andre phenicoler. Anvendelse af veterinærlægemidlet skal nøje overvejes, når følsomhedsbestemmelse har påvist resistens over for phenicoler, da effektiviteten kan nedsættes.

Opbevaringstid:

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år.
Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring:

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Efter åbning af beholderen: Opbevares under 25 °C. Opbevar beholderen i den ydre æske for at beskytte mod lys.

Udlevering:

B

Indehaver af markedsførings-tilladelsen:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Ostlandring 13
31303 Burgdorf
Tyskland

Repræsentant:

Scanvet Animal Health A/S
Kongevejen 66
3480 Fredensborg



Pakningsstørrelse:	Varenr.	Pakning	AUP ekskl. moms. DKK
Cefenicol 5 mg/ml	40 96 10	1 x 10 ml	208,29

For dagsaktuelle priser se: www.medicinpriser.dk

Cefenidex

Øjendråber, opløsning til katte og hunde.

Aktivt stof:

Chloramphenicol: 2,0 mg/ml.
Dexamethason: 1,0 mg/ml.

Terapeutiske indikation:

Behandling af inflammatoriske og allergiske øjnelidelser som f.eks. conjunctivitis, keratitis, mild iritis og inflammation i tåresækken, forbundet med bakterielle infektioner.

Dosering og indgivelsesmåde:

Okulær anvendelse.
1 dråbe (1 dråbe indeholder 0,06 mg chloramphenicol og 0,03 mg dexamethason) i konjunktivalsækken på det berørte øje eller om nødvendigt i begge øjne 6-8 gange dagligt i starten af behandlingen, derefter 4-6 gange dagligt. Svære tilfælde kan kræve hyppigere dosering (1 dråbe hver eller hver anden time) i de første 24-48 timer. Dette veterinær-lægemiddel bør kun anvendes indtil symptomerne på inflammation er forsvundet. Derefter bør behandlingen fortsættes med et antibiotikum, der kun indeholder ét aktivt stof.

Overdosering:

I tilfælde af overdosering bør behandlingen seponeres og øjnene skylles med vand, hvis irritationen varer ved.

Kontraindikationer:

- Må ikke anvendes i tilfælde af:
- overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne - virus- og svampeinfektioner i øjet
 - ulceration eller perforation i cornea

Særlige advarsler:

Inden behandlingen påbegyndes skal det sikres, at øjeninflammationen ikke skyldes mekaniske eller fysiske årsager, fx ektopisk øjenvippe, entropion (indadrullede øjenlåg), fremmedlegemer, eller mangel på tåresekretion.

Der er påvist krydsresistens mellem chloramphenicol og andre phenicoler. Anvendelse af veterinærlægemidlet skal nøje overvejes, når følsomhedsbestemmelse har påvist resistens over for phenicoler, da effektiviteten kan nedsættes.

Opbevaringstid:

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år.
Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring:

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Opbevar beholderen i den ydre æske for at beskytte mod lys.

Udlevering:

B

Indehaver af markedsførings-tilladelsen:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Ostlandring 13
31303 Burgdorf
Tyskland

Repræsentant:

Scanvet Animal Health A/S
Kongevejen 66
3480 Fredensborg



Pakningsstørrelse:	Varenr.	Pakning	AUP ekskl. moms. DKK
Cefenidex 2 mg/ml + 1 mg/ml	47 68 91	1 x 10 ml	219,20

For dagsaktuelle priser se: www.medicinpriser.dk

Produktresuméerne er ikke gengivet i deres helhed, hvorfor de gratis kan rekvireres hos ScanVet Animal Health A/S eller hentes hurtigt og nemt på www.vetisearch.dk