

Amdocyl®

amoxicillintrihydrat 800 mg/g
oralt pulver



Egenskaber

Amdocyl® er et bredspektret penicillin med baktericid virkning på mange grampositive og gramnegative bakterier.

Amdocyl® er vandopløseligt.

Amdocyl® absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt via mave-tarmkanalen og fordeles i hele kroppen. Udskilles via nyrerne.

Dyrearter

Gris.

Høns (slagte- og hønekyllinger, avlshøns).

Indikationer

Gris: luftvejs-, gastrointestinale og urogenitale infektioner, sekundære infektioner efter virale infektioner, septikæmi.

Høns: luftvejs- og gastrointestinale infektioner.

Dosering/indgivelse

Gris: 16,1 mg produkt/kg dyr/dag i 3-5 dage.

Høns: 28,7 mg produkt/kg dyr/dag i 3-5 dage.

Oralt via drikkevand og foder til gris.

Oralt via drikkevand til høns.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: Gris: 2 dage.

Slagtning: Høns: 1 dag.

Må ikke anvendes til fugle, hvis æg er bestemt til konsum inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse og i løbet af æglægningsperioden.

Pakningsstørrelse

1 x 1 kg (Vnr 55 61 84)

Se bagsiden for mere information.



Indikation

Gris: Behandling af luftvejs-, gastrointestinale og urogenitale infektioner, sekundære infektioner, der følger efter virale infektioner og septikæmi forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for amoxicillin.
Høns/kyllinger: Behandling af luftvejs- og gastrointestinale infektioner forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for amoxicillin.

Dosering

Til oral indgivelse via drikkevand eller foder til gris og via drikkevand til kyllinger. Gris: Anbefalet dosis: 16,1 mg Amdocyl®/ kg dyr/dag i 3-5 dage i træk (sv.t. 11,2 mg amoxicillin/kg dyr/dag i 3-5 dage) indgivet i 3-5 på hinanden følgende dage. Høns/kyllinger: Anbefalet dosis: 28,7 mg Amdocyl®/ kg dyr/dag i 3-5 dage i træk (sv.t. 20 mg amoxicillin/kg dyr/dag i 3-5 dage) indgivet i 3-5 på hinanden følgende dage.

Legemsvægten bør bestemmes så nøjagtigt som muligt, så man sikrer, at doseringen er korrekt og undgår underdosering. Ved klargøring af vand indeholdende lægemiddel bør der tages højde for det daglige vandforbrug. Mængden af vand indeholdende lægemiddel bør svare til den mængde, der indtages inden for de næste 12 timer. Ubrugt vand indeholdende lægemiddel bør kasseres efter 12 timer. Veterinærlægemidlet bør tilføres drikkevandet ved at røre grundigt, indtil midlet er fuldstændig opløst. Maksimal opløselighed i vand er ca. 6 g/liter. Ingen anden kilde til drikkevand bør være tilgængelig i den periode, hvor medicinen anvendes. Produktet kan også indgives sammen med foderet i den anbefalede daglige dosis. Denne indgivelsesmåde er kun beregnet til behandling af enkelte gris på gårde, hvor kun et lille antal grise skal behandles. Større grupper bør behandles med drikkevand indeholdende lægemiddel. Før hver indgivelse bør pulveret blandes grundigt i små mængder foder og indgives direkte til dyret.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der er overfølsomme over for penicilliner eller andre stoffer fra beta-lactam-gruppen. Bør ikke anvendes ved tilstedeværelse af β -lactamase-producerende bakterier. Bør ikke anvendes til lagomorfer, gnavere, drøvtyggere, heste eller dyr med alvorlig nyrelidelse, inkl. anuri og oliguri.

Bivirkninger

Penicilliner og cephalosporiner kan forårsage hypersensitivitet efter indgivelse. Allergiske reaktioner over for disse stoffer kan af og til være alvorlige.

Interaktion

Må ikke kombineres med bakteriestatiske antibiotika.
Samtidig anvendelse af aminoglykosider har synergistisk effekt.
Neomycin må ikke anvendes samtidigt, da det blokerer for absorptionen af orale penicilliner.

Særlige advarsler

Syge dyr har ændret drikkeadfærd og bør medicineres parenteralt, når det er muligt. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Brug af produktet bør baseres på en følsomhedstest af bakterien isoleret fra dyret. Hvis dette ikke er muligt, bør behandlingen baseres på lokal (regional, på gårdniveau) epidemiologisk information vedrørende målbakteriens følsomhed. Brug af produktet, der afviger fra anvisningerne i produktresuméet, kan øge antallet af tilfælde, der er bakterieresistente over for amoxicillin og mindske virkningen af behandlingen. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Penicilliner kan forårsage hypersensitive reaktioner (allergi) efter injektion, inhalation, indtagelse eller hudkontakt. Overfølsomhed over for penicilliner kan føre til krydsreaktioner med cephalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner over for disse stoffer kan af og til være alvorlige. Personer med en kendt hypersensitivitet over for beta-laktamantibiotika bør undgå berøring med produktet. Anvend produktet med forsigtighed, og tag alle de anbefalede forholdsregler. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug handsker og maske til dette formål. Undgå indånding af produktet. Vask hænder efter brug. Ved kontakt med øjne eller hud vaskes straks med vand. Hvis du udvikler symptomer, såsom hududslæt, efter udsættelse for produktet, bør du søge lægehjælp og vise lægen denne advarsel. Hævelser i ansigt, øjne eller på læber eller problemer med at trække vejret er alvorligere symptomer og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger, føtal toksicitet eller maternal toksicitet.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: Gris: 2 dage. Høns/kyllinger: 1 dag. Må ikke anvendes til fugle, hvis æg er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.

Pakningsstørrelse: 1 x 1 kg

Udleveringsgruppe: BP

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Dopharma Research B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holland.

Doseringsvejledning

Amdocyl®, dosering i gram/dag

GRIS Vægt i kg	Antal dyr				
	1	25	50	100	500
10	0,16	4,0	8,1	16,1	81
15	0,24	6,0	12,1	24,2	121
20	0,32	8,1	16,1	32,2	161
25	0,40	10,1	20,1	40,3	201
30	0,48	12,1	24,2	48,3	242
35	0,56	14,1	28,2	56,4	282
40	0,64	16,1	32,2	64,4	322
45	0,72	18,1	36,2	72,5	362
50	0,81	20,1	40,3	80,5	403

Anbefalet brug: 3-5 dage. Beregnet ud fra den anbefalede dosering i produktresuméet

Amdocyl®, dosering i gram/dag

HØNS Vægt i gram	Antal dyr				
	100	500	1000	2000	4000
50	0,14	0,7	1,4	2,9	6
100	0,29	1,4	2,9	5,7	11
250	0,72	3,6	7,2	14,4	29
500	1,44	7,2	14,4	28,7	57
750	2,15	10,8	21,5	43,1	86
1000	2,87	14,4	28,7	57,4	115
1250	3,59	17,9	35,9	71,8	144
1500	4,31	21,5	43,1	86,1	172
2000	5,74	28,7	57,4	114,8	230

Anbefalet brug: 3-5 dage. Beregnet ud fra den anbefalede dosering i produktresuméet

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.