

Combac® E-HP Vet.

Erysipelothrix rhusiopathiae

Glaesserella parasuis

injektionsvæske, emulsion



Egenskaber

Combac® E-HP Vet. er en two-shot vaccine godkendt til aktiv og passiv immunisering af grise mod *Erysipelothrix rhusiopathiae* (rødsyge) og *Glaesserella parasuis* (transportsyge) til henholdsvis grise i vækst, gylte og søer og diende grise.

- Varighed af immunitet hos grise til opfedning: 17 uger efter injektion af den anden vaccine dosis.
- Varighed af immunitet hos gylte/søer: 6 måneder efter injektion af den anden vaccinedosis.
- Varighed af immunitet hos diende grise: 3 uger efter første indtagelse af råmælk.

Combac® E-HP Vet. indeholder 4 stammer af *E. rhusiopathiae* (serotype 1 og 2) samt 3 stammer af *Glaesserella parasuis* (serotype 1, 5 og 13).

Combac® E-HP Vet. anvendes for at reducere kliniske tegn på rødsyge og for at reducere kliniske tegn og akutte læsioner ved Glässers sygdom.

Dyrearter

Grise.

Dosering/indgivelse

Grise i vækst: 1 ml i.m.

Gylte og søer: 2 ml i.m.

Kan gives fra 6 ugers alderen.

Vaccinationsprogram

Basisvaccination: Grise i vækst: 2 x 1 dosis med 3 ugers interval.
Gylte og søer: 2 x 1 dosis 6 og 3 uger før faring.

Opvarmes til stuetemperatur og omrystes før brug.

Pakningsstørrelse

1 x 50 ml (Vnr 13 96 39)

Se bagsiden for mere information.

Nyt SPC

Nu også
godkendt til
gylte og søer



salfarm
www.salfarm.com

Vaccine

Combac® E-HP Vet.

Erysipelothrix rhusiopathiae, *Glaesserella parasuis*
injektionsvæske, emulsion

Indikation

Aktiv immunisering af grise uden antistoffer mod *E. rhusiopathiae* (serotype 1 og 2) og *G. parasuis* (serotype 1, 5, og 13) fra 6 ugers alderen, samt reduktion af kliniske tegn på rødsyge (forårsaget af *E. rhusiopathiae* serotype 1 og 2), og reduktion af akutte kliniske tegn og akutte læsioner ved Glässer's sygdom (forårsaget af *G. parasuis*, serotype 1, 5 og 13).

Immunologiske egenskaber

Efter administration af vaccinen stimuleres aktiv immunitet mod *Erysipelothrix rhusiopathiae*, serotype 1 og serotype 2, og mod *Glaesserella parasuis* serovar 1, 5 og 13. Efter administration af vaccinen dannes der antistoffer, som kan påvises i serum.

Dosering

Dosis:

Grise i vækst 1 ml i.m.

Gylte og søer 2 ml i.m. (bag øret)

Opvarmes til stuetemperatur (15 – 25 °C) og omrystes grundigt før brug.

Vaccinationsprogram

Basisvaccination: 1 dosis gives 2 gange med 3 ugers interval.

Overdosering

Ud over reaktionerne beskrevet under bivirkninger, kan indgivelse af en dobbelt dosis til grise resultere i systemisk reaktion med tremor og hævelse (2-5 cm i diameter), rødme og smerte på injektionsstedet. Disse reaktioner forsvinder spontant inden for 4 dage.

Kontraindikationer

Ingen.

Bivirkninger

En mindre stigning i kropstemperatur (max 0,8 °C) er meget almindeligt, og varer op til 3 døgn efter vaccination. Apati, anorexi og somnolens efter vaccination forekommer almindeligt, og ophører inden for 6 timer. Opkast er en almindelig bivirkning, som ophører spontant i løbet af to timer.

Interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af dette lægemiddel sammen med andre lægemidler til dyr. Anvendelse af dette lægemiddel umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor besluttet med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:
Dette produkt indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående. Hvis du ved et uheld injicerer med dette produkt, skal du søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og tage indlægssedlen med dig. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen.

Til lægen: Dette produkt indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder, kan uforsætlig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKEG kirurgisk behandling, og der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig om fingerblødder eller -sener.

Drægtighed og diegivning

Drægtighed: Kan anvendes under drægtighed.

Laktation: Ikke relevant.

Fertilitet: Der foreligger ingen oplysninger om sikkerheden af denne vaccine hos avlsorner.

Må ikke anvendes til avlsorner.

Tilbageholdelsestid

0 dage

Pakningsstørrelse: 1 x 50 ml

Udleveringsgruppe: BP

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.