

Curofen

fenbendazol 50 mg/g

oralt pulver til grise



Egenskaber

Curofen er et fenbendazol til behandling af voksne rundorm samt larver (L₄) i mave-tarmkanal og luftveje hos grise.

Curofen kan også anvendes under drægtighed og diegivning.

Indikationer

Behandling af voksne rundorm samt larver (L₄) af følgende rundorm i mave-tarmkanal og luftveje:

Rød maveorm	<i>Hyostrongylus rubidus</i>
Knudeorm	<i>Oesophagostomum spp.</i>
Spolorm	<i>Ascaris suum</i>
Piskeorm	<i>Trichuris suis</i>
Lungeorm	<i>Metastrongylus apri</i> (≈ <i>M. elongatus</i>)

Dosering/indgivelse

1 gram Curofen/10 kg dyr.

Oralt via foder.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 6 døgn.

Pakningsstørrelse

1 kg (Vnr 46 24 94)

Pose i lukket plasticspand.

Medfølgende måleskeer:

Rød ske = 5 g Curofen

Sort ske = 20 g Curofen

Se bagsiden for mere information.



salfarm
www.salfarm.com

Antiparasitært

Curofen

fenbendazol 50 mg/g
oralt pulver til grise

Indikation

Behandling af følgende voksne rundorm samt larver (L₄) af i mave-tarmkanal og luftveje:

Rød maveorm	<i>Hyoststrongylus rubidus</i>
Knudeorm	<i>Oesophagostomum spp.</i>
Spolorm	<i>Ascaris suum</i>
Piskeorm	<i>Trichuris suis</i>
Lungeorm	<i>Metastrongylus apri</i> (≈ <i>M. elongatus</i>)

Udleveringsgruppe: BP

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Univet Ltd., Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan, Irland.

Dosering

Til oral administration via foderet.

Den anbefalede terapeutiske dosis er 5 mg fenbendazol pr. kg legemsvægt som individuel behandling med en enkelt dosis, hvilket svarer til 1 g af produktet pr. 10 kg legemsvægt.

Til behandling af piskeorm (*Trichuris suis*) anbefales det at opdele dosen og administrere den over syv dage.

For at sikre korrekt dosering og undgå potentiel underdosering bør legemsvægten og mængden af lægemiddel, der skal administreres, bestemmes så præcist som muligt. Den anbefalede mængde af veterinærlægemidlet bør opblandes grundigt i en lille portion af det enkelte dyrs beregnede daglige fodermængde i en spand eller lignende beholder umiddelbart før tildeling. Medicineret foder bør administreres umiddelbart efter klargøring. Ikke indtaget foder skal bortskaffes sammen med andet affaldsfoder og må ikke gives til andre dyr. Til brug hos individuelle grise på gårde, hvor kun et lille antal grise skal have veterinærlægemidlet.

DOSERINGSTABEL

Grisens legemsvægt (kg)	Mængde (g) af Curofen
50 kg	5 g
100 kg	10 g
150 kg	15 g
200 kg	20 g

Overdosering

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:
Dette produkt kan forårsage allergiske reaktioner. Ved overfølsomhed over for fenbendazol bør kontakt med veterinærlægemidlet undgås. Undgå hudkontakt i forbindelse med håndtering af dette produkt. Sørg for, at pulverstøvet ikke inhaleres. Brug beskyttelsestøj, inklusive uigennemtrængelige handsker og ansigtsmaske. Det anbefales at anvende en filtrerende engangshalvmask, der opfylder europæisk standard EN 149, eller et genanvendeligt åndedrætsværn af europæisk standard EN 140 med et filter af standard EN 143.

Vask hænder og al udsat hud efter brug.

Drægtighed og diegivning

Kan anvendes til drægtige eller diegivende søer.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 6 døgn.

Pakningsstørrelse: Pose i lukket plasticspand 1 kg

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.