

Ganutil

menbuton 100 mg/ml
injektionsvæske



Egenskaber

Menbuton stimulerer sekretion af trypsin (fra pankreas), propepsin (fra maveslimhinden) samt galde.

Ganutil fremmer energioptagelsen og fungerer som et hepatisk afgiftningsmiddel.

Dyrearter

Kvæg, grise, hest, får og ged.

Indikationer

Stimulering af lever- og fordøjelsesaktiviteten ved fordøjelsesforstyrrelser og leverinsufficiens.

Dosering/indgivelse

Kalv (< 6 mdr.), får, ged og grise: 1 ml/10 kg i.v. eller dybt i.m.

Kvæg: 1 ml/15-20 kg i.v.

Hest: 1 ml/20-40 kg i.v.

Kan gentages én gang efter 24 timer.

OBS: Indgivelse i.v. skal udføres langsomt (over mindst 1 minut) for at undgå bivirkninger.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn.

Mælk: 0 døgn.

Pakningsstørrelse

1 x 100 ml (Vnr. 03 94 11)

Se bagsiden for mere information.



Fordøjelse og metabolisme

Ganutil

menbuton 100 mg/ml
injektionsvæske

Indikation

Stimulering af lever- og fordøjelsesaktiviteten i tilfælde af fordøjelsesforstyrrelser og leverinsufficiens.

Dosering

Kalv: (op til 6 måneder), får, ged og grise: 1 ml pr. 10 kg (sv.t. 10 mg menbuton pr. kg kropsvægt) ved enten dyb intramuskulær eller langsom intravenøs administration.

Kvæg: 1 ml pr. 15-20 kg (sv.t. 5-7,5 mg menbuton pr. kg kropsvægt) ved langsom intravenøs administration.

Hest: 1 ml pr. 20-40 kg (sv.t. 2,5-5 mg menbuton pr. kg kropsvægt) ved langsom intravenøs administration.

Kan om nødvendigt gentages en gang efter 24 timer.

Overdosering

Der skal tages nøje hensyn til de anbefalede doser, da sikkerhedsfaktorerne ved menbuton ikke er kendte. Kardiovaskulære lægemidler skal anvendes i tilfælde af hjerteblok.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr med hjertesygdom eller i sidste trimester af drægtigheden. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Bivirkninger

Efter intravenøs administration kan der forekomme spytlåb, tåreflåd, rysten, spontan uriner og defækation. Efter intramuskulær administration kan der forekomme reaktion på injektionsstedet (ødem, blødning, nekrose). Der kan af og til ses uro og forøget åndedrætsfrekvens, og i sjældne tilfælde kan dyret forbigående lægge sig (især kvæg). I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktiske reaktioner, som skal behandles symptomatisk.

Interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Langsom intravenøs administration (over mindst 1 minut) tilrådes for at undgå bivirkninger. Det anbefales, at højst 20 ml injiceres intramuskulært på hvert administrationssted.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Undlad at spise, drikke eller ryge under håndtering af lægemidlet. Ved overfølsomhed overfor menbuton bør kontakt med lægemidlet undgås. I tilfælde af selvinjektion ved uheldigt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Drægtighed og diegivning

Drægtighed: Må ikke anvendes i sidste trimester.

Diegivning: Må anvendes til lakterende dyr.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn.

Mælk: 0 timer.

Pakningsstørrelse: 1 x 100 ml

Udleveringsgruppe: BP

ATC-Kode: QA 05 AX 90

Indehaver af markedsføringstilladelsen

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Tyskland

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.