

Hipposzol Vet.

omeprazol 400 mg
enterogranulat



Egenskaber

Omeprazol er en protonpumpehæmmer, der undertrykker udskillelsen af mavesyre. Mavesyreresistent granulat øger biotilgængeligheden. Det er et antacid til behandling af mavesår.

Dyrearter

Hest.

Indikationer

Til behandling af mavesår hos hest.

Dosering/indgivelse

Til oral administration. Gives med tørt foder.

Doseringen er 2 mg omeprazol pr. kg kropsvægt om dagen i 28 dage.

Hvert brev indeholder en tilstrækkelig mængde omeprazol til at behandle 200 kg kropsvægt. Brevene må ikke opdeles yderligere. Beregn derfor den nødvendige dosis (2 mg/kg om dagen) og afrund til nærmeste 200 kg-stigning. Bland det korrekte antal hele breve i en lille portion af hestens foder. Foderet må ikke være fugtigt.

Kropsvægt-intervaller (kg)	125-200	201-400	401-600	601-800
Antal breve	1	2	3	4

Oral administration.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 2 døgn.

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Pakningsstørrelse

1 x 28 breve (Vnr 15 44 69)

Se bagsiden for mere information.



Hippozol Vet.

omeprazol 400 mg
enterogranulat

Lægemiddelform

Enterogranulat.
Hvert brev på 5 gram indeholder omeprazol 400 mg.

Dyrearter

Hest.

Indikation

Til behandling af mavesår hos hest.

Dosering

Doseringen er 2 mg omeprazol pr. kg kropsvægt om dagen i 28 dage. Gives oralt via foder. Hvert brev indeholder en tilstrækkelig mængde omeprazol til at behandle 200 kg kropsvægt. Brevene må ikke opdeles yderligere. Beregn derfor den nødvendige dosis (2 mg/kg om dagen) og afrund til nærmeste 200 kg-stigning. Bland det korrekte antal hele breve i en lille portion af hestens foder. Foderet må ikke være fugtigt.

Overdosering

Der er ikke observeret nogen uønskede bivirkninger i flere studier, hvor der bl.a. har været doseret op til 40 mg/kg over mindst 3 uger.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bivirkninger

Der findes ingen kendte behandlingsrelaterede kliniske bivirkninger.

Interaktion

Omeprazol kan forsinke elimineringen af warfarin. Interaktion med lægemidler, der kan metaboliseres af leverenzymen, kan ikke udelukkes. Omeprazol kan potentielt ændre benzodiazepinernes metabolisme og forlænge virkninger på centralvervesystemet. Clarithromycin kan forhøje niveauerne af omeprazol. Omeprazol kan reducere cyclosporins metabolisme. Omeprazol kan reducere absorptionen af lægemidler, der kræver nedsat gastrisk pH for at opnå optimal absorption (ketoconazol, itraconazol, jern, ampicilinstere).

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Da produktets sikkerhed ved anvendelse til hest under 8 måneder eller med en kropsvægt på under 125 kg ikke er undersøgt, anbefales det ikke at bruge produktet til disse dyr. Stress (herunder krævende træning og konkurrencer på højt niveau) samt praksis hvad angår fodring, pasning og pleje kan være forbundet med udvikling af mavesår hos heste. Personer, der er ansvarlige for hestens velfærd, bør overveje at reducere den ulcerogene risiko ved at tilpasse vaner i pasning og pleje således, at et eller flere af følgende opnås: nedsat stress, nedsat faste, øget indtagelse af grovfoder og adgang til græsning. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Dette produkt kan forårsage uønskede gastrointestinale virkninger eller overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), hvis det indtages ved et uheld, især af børn. Spis og drik ikke, når produktet håndteres eller administreres. Vask hænder og anden eksponeret hud efter brug. Eventuelle delvist brugte breve skal lægges i den originale pakning og opbevares på et egnet sted, der er utilgængeligt for børn. I tilfælde af selvdokumentation ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, hvis symptomerne varer ved. Det gælder især børn.

Drægtighed og diegivning

Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger af omeprazol. Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk forholdet.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 2 døgn
Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Pakningsstørrelse: 1 x 28 breve à 5 g

Udleveringsgruppe: BP

Pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Ostlandring 13, 31303 Burgdorf, Tyskland

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.