

Hippozol Vet.

omeprazol 400 mg



Hippozol Vet.

omeprazol 400 mg


Omeprazol med æblesmag.
Gives med lidt foder for let behandling.

salfarm
www.salfarm.com

Dosering ved behandling af mavesår

2 mg omeprazol pr. kg kropsvægt én gang om dagen i 28 dage i træk.

► Et brev Hippozol Vet. pr. 200 kg kropsvægt.

	Kropsvægt	Antal breve pr. dag
	> 600 kg-800 kg	
	> 400 kg-600 kg	
	> 200 kg-400 kg	
	125-200 kg	



Gives med
lidt tørfoder -
let behandling





En god mavefornemmelse...

Hippozol Vet. granulat er det første registrerede veterinære lægemiddel, som indeholder omeprazol i et mavesyreresistent enterogranulat.

Den specielle coating betyder, at man kan behandle mavesår med 2 mg/kg, samt give medicinen iblandet lidt af hestens tørfoder! ^{1, 2}


Hvorfor kan Hippozol Vet. gives med tørfoder?

Det mavesyreresistente enterogranulat i **Hippozol Vet.** medfører, at det ellers mavesyrefølsomme omeprazol ikke nedbrydes i den lave pH i ventriklen, men i stedet kommer ubeskadiget frem til tarmen.


I det basiske miljø i tarmen frigives omeprazol og bliver absorberet. Via blodkredsløbet når det frem til parietalcellerne i mavesækkens slimhinde og aktiveres. Herved hæmmes mavesyresekretionen effektivt.

Samme effekt selv med halv dosis

Sammenlignet med buffered pasta opnås samme effekt. Der er således ingen signifikant klinisk forskel mellem brugen af **Hippozol Vet.** og pasta i behandling af hverken ESGD eller EGGD.³



► Når en større mængde omeprazol kan passere ventriklen ubeskadiget, så vil en tilsvarende større mængde også være tilgængelig for kroppen.





Hippozol Vet. omeprazol 400 mg **Lægemiddelform:** Enterogranulat. Hvert brev på 5 gram indeholder omeprazol 400 mg **Dyreart:** Hest. **Indikationer:** Til behandling af mavesår hos hest. **Dosering:** Doseringen er 2 mg omeprazol pr. kg kropsvægt om dagen i 28 dage. Gives oralt via foder. Hvert brev indeholder en tilstrækkelig mængde omeprazol til at behandle 200 kg kropsvægt. Brevene må ikke opdeles yderligere. Beregn derfor den nødvendige dosis (2 mg/kg om dagen) og afrund til nærmeste 200 kg-stigning. Bland det korrekte antal hele breve i en lille portion af hestens foder. Foderet må ikke være fugtigt. **Overdosering:** Der er ikke observeret nogen uønskede bivirkninger i flere studier, hvor der bl.a. har været doseret op til 40 mg/kg over mindst 3 uger. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. **Bivirkninger:** Der findes ingen kendte behandlingsrelaterede kliniske bivirkninger. **Interaktion:** Omeprazol kan forsinke elimineringen af warfarin. Interaktion med lægemidler, der kan metaboliseres af leverenzymen, kan ikke udelukkes. Omeprazol kan potentielt ændre benzodiazepinernes metabolisme og forlænge virkninger på centralvervesystemet. Clarithromycin kan forhøje niveauerne af omeprazol. Omeprazol kan reducere cyclosporins metabolisme. Omeprazol kan reducere absorptionen af lægemidler, der kræver nedsat gastrisk pH for at opnå optimal absorption (ketoconazol, itraconazol, jern, ampicilinstere). **Særlige advarsler:** Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Da produktets sikkerhed ved anvendelse til hest under 8 måneder eller med en kropsvægt på under 125 kg ikke er undersøgt, anbefales det ikke at bruge produktet til disse dyr. Stress (herunder krævende træning og konkurrencer på højt niveau) samt praksis hvad angår fodring, pasning og pleje kan være forbundet med udvikling af mavesår hos heste. Personer, der er ansvarlige for hestens velfærd, bør overveje at reducere den ulcerogene risiko ved at tilpasse vaner i pasning og pleje således, at et eller flere af følgende opnås: nedsat stress, nedsat faste, øget indtagelse af grovfoder og adgang til græsning. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Dette produkt kan forårsage uønskede gastrointestinale virkninger eller overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), hvis det indtages ved et uheld, især af børn. Spis og drik ikke, når produktet håndteres eller administreres. Vask hænder og anden eksponeret hud efter brug. Eventuelle delvist brugte breve skal lægges i den originale pakning og opbevares på et egnet sted, der er utilgængeligt for børn. I tilfælde af selvdagivelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, hvis symptomerne varer ved. Det gælder især børn. **Drægtighed og diegivning:** Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger af omeprazol. Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk forholdet. **Tilbageholdelsestid:** Slagtning: 2 døgn. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. **Pakninger:** 1 x 28 breve à 5 g **Udleveringsgruppe:** BP **Pris:** For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Ostlandring 13, 31303 Burgdorf, Tyskland

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.

Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding. Tlf.: 75 50 80 80. E-mail: info@salfarm.com

Kilder:

1 SPC Hippozol Vet. - Se på www.produktresume.dk

2 Sykes BW, Hewetson M, Hepburn RJ, Luthersson N, Tamzali Y. European College of Equine Internal Medicine Consensus Statement – Equine Gastric Ulcer Syndrome in Adult Horses. J Vet Intern Med. 2015;29(5):1288–1299. doi:10.1111/jvim.13578.

3 Barton, A.K. et al., Vergleich des Therapieerfolgs zweier Omeprazolpräparate und Übereinstimmung zwischen zwei Untersuchern beim Equinen Gastric Ulcer Syndrome (EGUS), Equine Medicine 38 (2022) 2 (März/April) 118–126

salfarm
www.salfarm.com

04.20.25/DK
20220127