

Hyobac[®] App Multi Vet.

Actinobacillus pleuropneumoniae
injektionsvæske, emulsion



Egenskaber

Hyobac[®] App Multi Vet. er godkendt til immunisering af svin mod ondartet lungesygge forårsaget af *A. pleuropneumoniae* type 2, 5 og 6.

Hyobac[®] App Multi Vet. indeholder inaktiverede bakterier (*A. pleuropneumoniae* type 2, 5 og 6) samt alle tre *Apx* toxoider (Apx I, II og III).

Hyobac[®] App Multi Vet. er en two-shot vaccine (1 dosis = 1 ml). For fuld effekt bør grisene vaccineres 2 gange med 3 ugers mellemrum.

Grisene kan vaccineres fra 6 ugers alderen.

Immunitet

Indtræder 21 dage efter 2. vaccination.

Beskyttelse

Fuld beskyttelse i en periode på 20 uger efter korrekt vaccination.

Pakningsstørrelse

1 x 100 ml (Vnr 43 45 36)

Se bagsiden for mere information.



salfarm
www.salfarm.com

Vaccine

Hyobac® App multi Vet.

Actinobacillus pleuropneumoniae
injektionsvæske, emulsion

Terapeutiske indikationer

Til aktiv immunisering af grise for at beskytte mod kliniske symptomer og for at reducere lungelæsioner forårsaget af en infektion med *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 2, 5 eller 6.

Indtræden af immunitet: 3 uger efter anden vaccinedosis.

Varighed af immunitet: 20 uger efter anden vaccinedosis

Immunologiske egenskaber

Vaccinen indeholder inaktiveret *A. pleuropneumoniae* serotype 2, 5 og 6-antigen og Apx I, II og III toxoider. Efter parenteral administration, inducerer disse antigener produktion af specifikke antistoffer, som hjælper med at beskytte den vaccinerede organisme mod kliniske symptomer og til reduktion af lungelæsioner af en Ap-infektion. Hos vaccinerede grise observeres signifikant færre kliniske symptomer af *A. pleuropneumoniae*. Grundet indhold af Apx I, II og III toxoider i vaccinen vil symptomer på Ap-infektion forårsaget af andre serotyper end 2, 5 og 6 ligeledes være reduceret. Vaccinen indeholder inaktiverede bakterier og toxiner, som optages gradvist fra administrationsområdet.

Administrationsveje og dosering

Intramuskulær anvendelse.

Lad vaccinen opnå stuetemperatur (15 °C-25 °C) og omryst grundigt før brug.

Vaccinationsprogram:

1 dosis (1 ml) injiceres dybt i nakkemuskulaturen bag øret, fra 6-ugers alderen.

Revaccination med samme dosis 3 uger senere

Overdosering

Dobbelt dosis af vaccinen medfører ingen bivirkninger hos grise, bortset fra de bivirkninger, der nævnes i afsnittet "Bivirkninger".

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, adjuvans eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler: Kun raske dyr må vaccineres.

Bivirkninger

Let sløvhed, somnolens og tremor forekommer meget almindeligt efter injektion og vil forsvinde spontant inden for nogle timer. Opkastninger forekommer meget ofte hos vaccinerede grise, der lige har indtaget foder. Lokal reaktion (rødme og/eller hævelse) forekommer meget ofte på injektionsstedet. Denne reaktion forsvinder spontant inden for nogle dage. Midlertidig stigning i kropstemperatur på op til 1,1 °C kan ses hos vaccinerede dyr.

Interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinationen sammen med andre veterinærlægemidler.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:

Til brugeren:

Dette produkt indeholder mineralsk olie. Uforståelig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående. Hvis du ved et uheld injiceres med dette produkt, skal du søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og tage indlægssedlen med dig. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen.

Til lægen:

Dette produkt indeholder mineralsk olie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder, kan uforståelig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves **ØJEBLIKKE** kirurgisk behandling, og der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig om fingrenes bløddele eller sener.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Pakningsstørrelse: 1 x 100 ml

Udleveringsgruppe: BP

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.