

Insistor® Vet.

methadonhydrochlorid 10 mg/ml
injektionsvæske, opløsning



Egenskaber

Insistor® Vet. indeholder methadon, der er et opiumderivat som påvirker NMDA- og μ -opioidreceptorer.

Insistor® Vet. kan fremkalde dyb analgesi og kan anvendes ved præmedicinering og sedering.

Insistor® Vet. har en virkningstid på 1,5 - 6,5 timer med T_{max} allerede efter 5-15 minutter.

Dyrearter

Hund og kat.

Indikationer

Analgesi og præmedicinering til generel anæstesi eller neurolept-analgesi i kombination med et neuroleptisk lægemiddel.

Dosering/indgivelse

Hund: 0,05-0,1 ml pr. kg kropsvægt, s.c., i.m. eller i.v.

Kat: 0,03-0,06 ml pr. kg kropsvægt, i.m.

Pakningsstørrelse

1 x 10 ml (Vnr 14 02 49)

Se bagsiden for mere information.

salfarm
www.salfarm.com



Opiod

Insistor® Vet.

methadonhydrochlorid 10 mg/ml
injektionsvæske, opløsning

Lægemiddelform

Insistor® Vet. (methadonhydrochlorid) 10 mg/ml, injektionsvæske, opløsning.

Dyrearter

Hund og kat.

Indikation

Analgesi og præmedicinering til generel anæstesi eller neuroleptanalgesi i kombination med et neuroleptisk lægemiddel.

Dosering

Hund: 0,05-0,1 ml pr. kg kropsvægt, s.c., i.m. eller i.v. Kat: 0,03-0,06 ml pr. kg kropsvægt, i.m. Hos hunde indtræder virkningen 1 time efter subkutan administration, ca. 15 minutter efter intramuskulær injektion og inden for 10 minutter efter intravenøs injektion. Varigheden af virkningen er ca. 4 timer efter intramuskulær eller intravenøs administration. Hos katte indtræder virkningen ved intramuskulær administration efter 15 minutter, og varigheden af virkningen er i gennemsnit 4 timer. For kombinationsdosering henvises til SPC.

Overdosering

En 1,5 gange overdosis resulterede i de virkninger, der er beskrevet under bivirkninger. Katte: I tilfælde af overdoser (> 2 mg/kg) kan følgende tegn observeres: Forøget spytlåd, excitation, bagbensparalyse og tab af balancerefleks. Krampeanfald, konvulsion og hypoksi blev også registreret hos nogle katte. En dosis på 4 mg/kg kan eventuelt være dødelig for katte. Hunde: Respirationsdepression. Methadon kan antagoniseres ved hjælp af naloxon (startdosis på 0,1 mg/kg i.v. anbefales).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr med fremskreden respirationsinsufficiens eller til dyr med svær lever- og nyredysfunktion. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne.

Bivirkninger

Følgende forbigående bivirkninger er meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr): Katte: Respirationsdepression, lette excitatoriske reaktioner, læbeslikning, stemmebrug, vandladning, defækation, pupildilatation, hyperalgesi, hypertermi og diarré. Hyperalgesi er blevet rapporteret. Hunde: Respirationsdepression, bradykardi, gispning, læbeslikning, spytlåd, stemmebrug, uregelmæssig vejtrækning, hypotermi, fikseret stirren og kropsrysten, vandladning og defækation.

Interaktion

Methadon kan forstærke virkningerne af analgetika, hæmmere af centralnervesystemet og stoffer, der forårsager respirationsdepression. Anvendelse af lægemidlet sammen med eller efter anvendelse af buprenorfin kan medføre manglende virkning.

Særlige advarsler

På grund af det varierende individuelle respons på methadon bør dyrene overvåges regelmæssigt for at sikre tilstrækkelig virkning. Hos katte ses pupildilatation længe efter, at den analgetiske virkning har fortaget sig. Mynder kan have brug for højere doser end andre racer for at opnå effektive plasmaniveauer. Særlige forsigtighedsregler for dyr: Methadon kan lejlighedsvis forårsage respirationsdepression, og der skal som ved andre opioider udvises forsigtighed ved behandling af dyr med nedsat respirationsfunktion eller ved samtidig behandling med respirationshæmmende medicin. Da methadon metaboliseres i leveren, kan dets styrke og virkningsvarighed være påvirket hos dyr med nedsat leverfunktion. Der kan i tilfælde af nyre-, hjerte- eller leverdysfunktion eller shock være en større risiko forbundet med brugen af lægemidlet. Sikkerheden ved methadon er ikke blevet vist hos hunde under 8 uger og katte under 5 måneder. På grund af risikoen for excitation bør gentagen administration hos katte anvendes med forsigtighed. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Methadon kan forårsage respirationsdepression efter kontakt med huden eller uforsættlig selvinjektion. Undgå kontakt med hud, øjne og mund, og bær impermeable handsker ved håndtering af lægemidlet. Ved overfølsomhed over for methadon bør kontakt med lægemidlet undgås. Methadon har potentiale til at forårsage dødfødsler. Gravide kvinder rådes til ikke at håndtere lægemidlet. I tilfælde af selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlæggssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

UNDLAD AT KØRE BIL, da der kan forekomme sedation. Råd til læger: Methadon er et opioid, hvis toksicitet kan forårsage kliniske virkninger, herunder respirationsdepression eller apnø, sedation, hypotension og koma. Administration af opioidantagonisten naloxon anbefales til revertering af symptomerne.

Drægtighed og diegivning

Methadon diffunderer over placenta. Studier med laboratoriedyr har vist reproduktionsmæssige bivirkninger. Sikkerheden af lægemidlet under drægtighed og diegivning er ikke undersøgt, og anvendelse frarådes under drægtighed eller diegivning.

Pakningsstørrelse: 1 x 10 ml

Udleveringsgruppe: AP4 (kopieringspligtig)

Pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Østrig.

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.