


Saniotic® vet

(miconazol, prednisolon, polymyxin B)

Har du også svært ved at løse otitis-puslespillet?




Den **synergistiske effekt** af polymyxin B og miconazol kan være **den manglende brik i dit puslespil** !



salfarm
www.salfarm.com

Saniotic® vet.

(miconazol, prednisolon, polymyxin B)



- Aktive substanser med effektiv synergi²
- Tredobbelt forsvar mod *otitis externa* og lokal dermatitis³
- Intensiveret antibakteriel og antifungal effekt³
- Den synergistiske effekt af polymyxin B og miconazol nedsætter risikoen for udvikling af resistens³
- 20 ml flaske

Kilder:

- 1: Picture: Alison Wilson - *Malassezia* spp
- 2: Pietschmann, S., Hoffmann, K., Voget, M., Pison, U.: Synergistic effects of Miconazole and PolymyxinB on microbial pathogens; Vet Res Commun (2009) 33; 489-505
- 3: Voget, M; Treatment of otitis externa in the dog with Polymyxin B and Miconazole - Explanations for the success of this combination over the past decades; VetScio's Records of Veterinary Practice - Vol. 0 -Issue 1 - 2019

Saniotic® vet. (miconazolnitrat 23 mg/ml, prednisolonacetat 5 mg/ml, polymyxin B-sulfat 0,53 mg/ml)

Indikationsområde

Hund og kat: Til behandling af *otitis externa* og små lokaliserede, overfladiske hudinfektioner hos hunde og katte forårsaget af infektioner med følgende miconazol- og polymyxin B-følsomme bakterier og svampe: Grampositive bakterier: *Staphylococcus* spp. *Streptococcus* spp. Gramnegative bakterier: *Pseudomonas* spp. *Escherichia coli*, Svampe: *Malassezia pachydermatis*, *Candida* spp. *Microsporum* spp. *Trichophyton* spp. Behandling af *Otodectes cynotis*-angreb (øremider), hvor der samtidig er infektion med miconazol- og polymyxin B-følsomme patogener.

Dosering

Til anvendelse i øret og kutan anvendelse. Ved behandlingsstart skal hår, der omgiver eller dækker læsionerne, klippes væk. Rens den ydre øregang og det ydre øre og dryp 5 dråber i den ydre øregang to gange daglig. Massér forsigtigt øret og øregangen omhyggeligt for at sikre en ordentlig fordeling. Behandlingen fortsættes uden afbrydelse indtil et par dage efter, de kliniske symptomer er fuldstændigt forsvundet; mindst i 7-10 dage og op til 14 dage. Effekten af behandlingen bør verificeres af en dyrlæge før behandlingen stoppes. Hudinfektioner (små lokaliserede, overfladiske): to gange daglig nogle få dråber på de hudlæsioner, der skal behandles, og masser det grundigt ind. Behandlingen fortsættes uden afbrydelse indtil et par dage efter, de kliniske symptomer er fuldstændigt forsvundet; op til 14 dage. I nogle vedvarende tilfælde (øre- eller hudinfektioner) kan det være nødvendigt, at behandlingen fortsættes i 2 til 3 uger. I tilfælde, hvor en langvarig behandling er nødvendig, skal der foretages gentagne kliniske undersøgelser.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer i veterinærlægemidlet, andre kortikosteroider, andre azol-antismidmidler eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til dyr med perforeret *Membrana Tympani* eller til dyr, hvor der er en kendt resistens hos de sygdomsfremkaldende agenser over for polymyxin B og/eller miconazol. Bør ikke anvendes på mælkekirtlerne hos diegivende.

Bivirkninger og risici

Kan meget sjældent være forbundet med forekomst af døvhed (især hos ældre hunde). I tilfælde af dette bør behandlingen afbrydes. Langvarig og omfattende brug af topiske kortikosteroidpræparater er kendt for at udløse lokal immunsuppression, herunder øget risiko for infektion, tynd epidermis og forsinket sårheling, teleangiectasi og øget følsomhed for blødning i huden, samt systemiske virkninger og undertrykkelse af binyrefunktionen.

Interaktion

Der foreligger ingen data.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Brugen af lægemidlet bør baseres på test af følsomheden hos de bakterier og/eller de svampe, der isoleres fra dyret. Hvis dette ikke er muligt, bør behandlingen baseres på lokale (regionale) epidemiologiske oplysninger om følsomheden hos de pågældende patogener. Ved tilfælde af samtidig *Otodectes cynotis* angreb (øremider) skal der overvejes behandling med et passende, systemisk acaricid. Inden behandling med lægemidlet skal det sikres, at *Membrana Tympani* er intakt. Systemiske kortikosteroidvirkninger er mulige, især når lægemidlet anvendes under en okklusiv forbinding, på omfattende hudlæsioner, ved forøget blodgennemstrømning af huden, eller hvis lægemidlet indtages ved slikning. Oral indtagelse af lægemidlet hos dyr, der behandles, eller dyr, der har kontakt med behandlede dyr, bør undgås. Undgå kontakt med dyrets øjne. I tilfælde af kontakt med dyrets øjne, skyl grundigt med vand. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Ved overfølsomhed over for prednisolon, polymyxin B eller miconazol bør kontakt med lægemidlet undgås. Undgå kontakt med hud eller øjne. Lægemidlet kan give irritation på hud og i øjne. I tilfælde af utilsigtet spild bør hud eller øjne straks skylles med rigelige mængder vand. Brug altid engangshandsker ved anvendelse af lægemidlet til dyr. Vask hænder efter brug. Vær omhyggelig med at undgå utilsigtet indtagelse. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal en læge straks konsulteres. Vis indlægssedlen eller etiketten til lægen. Drægtighed og diegivning Sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Da absorption af miconazol, polymyxin B og prednisolon gennem huden er lav, forventes ingen teratogene/embryotoksiske/fetotoksiske og maternotoksiske virkninger hos hunde og katte. Der kan muligvis forekomme en oral indtagelse af de aktive stoffer hos behandlede dyr, når de soigner sig selv med tungen, og der kan forventes en overførsel af de aktive bestanddele til blod og mælk. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.

Overdosering

Der forventes ingen andre symptomer end dem, der er nævnt under Bivirkninger og risici.

Pakningsstørrelse: 20 ml

Udlieferingsgruppe: B

Pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Østrig

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.
Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 7550 8080,
Email: info@salfarm.com

salfarm
www.salfarm.com