

Saniotic® Vet.

miconazolnitrat 23 mg/ml, prednisolonacetat 5 mg/ml

polymyxin B-sulfat 0,53 mg/ml

kutansuspension/øredråber, suspension



Egenskaber

Saniotic® Vet. er godkendt til behandling af otitis externa og små lokaliserede, overfladiske hudinfektioner hos hund og kat.

Saniotic® Vet. har fungistatisk/fungicid, baktericid, acaricid og kortikosteroid effekt.

Indikationer

Infektioner i det ydre øre eller på huden med følgende miconazol- og polymyxin B-følsomme patogener - evt. kombineret med mider:

Grampositive bakterier:

Staphylococcus spp., *Streptococcus spp.*

Gramnegative bakterier:

Pseudomonas spp., *Escherichia coli.*

Svampe:

Malassezia pachydermatis, *Candida spp.*, *Microsporum spp.*, *Trichophyton spp.*

Mider:

Otodectes cynotis-angreb.

(ved samtidig infektion med miconazol- og polymyxin B-følsomme patogener).

Dosering/indgivelse

Otitis externa:

5 dråber i den ydre øregang to gange daglig i mindst 7-10 dage og op til 3 uger.

Hudinfektioner:

Få dråber to gange dagligt påføres hudlæsionen i op til 3 uger.

Pakningsstørrelse

1 x 20 ml (Vnr 52 79 14)

Se bagsiden for mere information.



salfarm
www.salfarm.com

Øredråber

Saniotic® Vet.

miconazolnitrat 23 mg/ml, prednisolonacetat 5 mg/ml

polymyxin B-sulfat 0,53 mg/ml

kutansuspension/øredråber, suspension

Indikation

Hund og kat: Til behandling af otitis externa og små lokaliserede, overfladiske hudinfektioner, forårsaget af infektioner med følgende miconazol- og polymyxin B-følsomme bakterier og svampe: Grampositive bakterier: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* Gramnegative bakterier: *Pseudomonas spp.*, *Escherichia coli*. Svampe: *Malassezia pachydermatis*, *Candida spp.*, *Microsporum spp.*, *Trichophyton spp.*. Behandling af *Otodectes cynotis*-angreb, hvor der samtidig er infektion med miconazol- og polymyxin B-følsomme patogener.

Dosering

Til anvendelse i øret og kutan anvendelse hos hund og kat. Omrystes grundigt før brug. Ved behandlingsstart skal hår, der omgiver eller dækker læsionerne, klippes væk.

Infektioner i den ydre øregang (otitis externa): Rens den ydre øregang og det ydre øre og dryp med 5 dråber to gange dagligt. Massér øret og øregangen omhyggeligt for at sikre en ordentlig fordeling af de aktive stoffer. Behandlingen fortsættes uden afbrydelse indtil et par dage efter, de kliniske symptomer er fuldstændigt forsvundet. Mindst i 7-10 dage og op til 14 dage. Effekten af behandlingen bør verificeres af en dyrlæge, før behandlingen stoppes. Hudinfektioner (små lokaliserede, overfladiske): Påfør to gange daglig nogle få dråber på de hudlæsioner, der skal behandles, og massér det grundigt ind. Behandlingen fortsættes uden afbrydelse indtil et par dage efter, de kliniske symptomer er fuldstændigt forsvundet og op til 14 dage. I vedvarende tilfælde kan det være nødvendigt, at behandlingen fortsættes i 2 til 3 uger.

Overdosering

Der forventes ingen andre symptomer end dem, der er nævnt under "Bivirkninger og risici".

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, andre kortikosteroider, andre azol-antisvampemidler eller over for et eller flere af hjælpestofferne, til dyr med perforerede trommehinder, på mælkekirtlerne hos diegivende hunnhunde og hunkatte eller til behandling af dyr med kendt resistens hos de sygdomsfremkaldende agenser over for polymyxin B og/eller miconazol.

Bivirkninger og risici

Anvendelse af dette veterinærlægemiddel kan meget sjældent være forbundet med forekomst af døvhed (især hos ældre hunde). I tilfælde af dette bør behandlingen afbrydes.

Langvarig og omfattende brug af topikale kortikosteroidpræparater er kendt for at udløse lokal immunsuppression, herunder øget risiko for infektion, tynd epidermis og forsinket sårheling, teleangiektasi og øget følsomhed for blødning i huden, samt systemiske virkninger, herunder undertrykkelse af binyrefunktionen.

Interaktion

Der foreligger ingen data.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Bakteriel og fungal otitis er ofte af sekundær karakter. Den primære årsag bør identificeres og behandles. Brugen af lægemidlet bør baseres på en mikrobiologisk undersøgelse og en test af følsomheden hos de bakterier og/eller svampe, der isoleres fra dyret, eller på lokale epidemiologiske oplysninger om følsomheden hos de pågældende patogener.

Ved tilfælde af samtidig *Otodectes Cynotis* angreb (øremider) skal der overvejes behandling med et passende systemisk acaricid. Systemiske kortikosteroidvirkninger er mulige. Oral indtagelse af lægemidlet bør undgås. Kontakt med øjne skal undgås. I tilfælde af kontakt med øjne skylles grundigt med vand.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Ved overfølsomhed over for prednisolon, polymyxin B eller miconazol bør kontakt med lægemidlet undgås. Undgå kontakt med hud eller øjne. I tilfælde af utilsigtet spild bør hud eller øjne straks skylles med rigelige mængder vand. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal en læge straks konsulteres, og indlæggssedlen medbringes.

Drægtighed og diegivning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Da absorption af miconazol, polymyxin B og prednisolon gennem huden er lav, forventes ingen teratogene/embryotoksiske/føtotoksiske og maternotoksiske virkninger hos hunde og katte. Ved oral indtagelse kan der forventes en overførsel af de aktive bestanddele til blod og mælk.

Pakningsstørrelse: 20 ml

Udleveringsgruppe: B

Pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Østrig

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.