

Terramycin Vet.

1 g indeholder 200 mg oxytetracyklinhydrochlorid
pulver til oral opløsning



Egenskaber

Terramycin Vet. er et bredspektret antibiotikum med bakteriostatisk virkning på både aerobe og anaerobe, grampositive og gramnegative bakterier, *Rikketsia*, *Mycoplasma* og *Chlamydia*.

Absorptionen afhænger af dyreart og foderemner og vil maks. være 50%.

Halvdelen af den absorberede mængde **Terramycin Vet.** bindes til plasmaproteinerne. Plasma/lungeratio er 1:1,5 og plasma/næseslimhinderatio er 1:5.

Terramycin Vet. udskilles efter absorption i galde, urin og mælk, men nedbrydes hurtigt i miljøet under tilstedeværelse af ilt.

Dyrearter

Kvæg, gris, pelsdyr, fjerkræ, hund og kat.

Indikation

Infektioner forårsaget af tetracyklinfølsomme bakterier.

Dosering

Præruminante kalve

Tarmbetændelse: 1 g pulver/20 kg legemsvægt i 3-5 dage.

Systemisk behandling: 1 g pulver/8 kg legemsvægt i 3-5 dage.

Grise

Tarmbetændelse: 1 g pulver/20 kg legemsvægt i 3-5 dage.

Systemisk behandling: 1 g pulver/ 8 kg legemsvægt (25 mg/kg) i 3-5 dage.

Hund, kat, mink og fjerkræ

1 g pulver/4 kg legemsvægt i 3-5 dage.

Indgivelse

Gives peroralt efter opløsning i drikkevand eller opblanding med foder.

Terramycin Vet. i vandig opløsning er kun holdbar i maks. 24 timer.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 30 døgn.

Æg: 30 døgn.

Pakningsstørrelse

6 x 500 g (Vnr 56 88 64)

Se bagsiden for mere information.



salfarm
www.salfarm.com

Antibiotikum

Terramycin Vet.

200 mg oxytetracyklinhydrochlorid/g pulver
pulver til oral opløsning

Dyrearter

Kvæg. Gris. Pelsdyr. Fjerkræ. Hund. Kat.

Indikation

Infektioner forårsaget af tetracyklinfølsomme bakterier.

Dosering

Præruminante kalve

Tarmbetændelse: 10 mg oxytetracyklin/kg legemsvægt sv.t.

1 g pulver/20 kg legemsvægt i 3-5 dage.

Systemisk behandling: 25 mg oxytetracyklin/kg legemsvægt sv.t.

1 g pulver/8 kg legemsvægt i 3-5 dage.

Gris

Tarmbetændelse: 10 mg oxytetracyklin/kg legemsvægt sv.t.

1 g pulver/20 kg legemsvægt i 3-5 dage.

Systemisk behandling: 25-30 mg oxytetracyklin/kg legemsvægt sv.t.

1 g pulver/ 8 kg legemsvægt (25 mg/kg) i 3-5 dage.

Hund, kat, mink og fjerkræ

50 mg oxytetracyklin/kg legemsvægt sv.t.

1 g pulver/4 kg legemsvægt i 3-5 dage.

Dosering og indgivelsesmåde

Gives peroralt efter opløsning i drikkevand eller opblanding med foder.

Oxytetracyklin i vandig opløsning er kun holdbar i maks. 24 timer.

Dosis kan fordeles på én eller to daglige doseringer.

Ved dosering i drikkevand eller foder bør den daglige dosering beregnes ud fra den samlede vægt på de dyr, der skal behandles. Dagligt forbrug af mængde pulver (g) beregnes efter følgende formel: $(V \times D)/P$; V=samlede vægt (kg) på dyr i behandling; D=ønskede dosis i mg/kg legemsvægt; P=mg oxytetracyklin/ g pulver (20% = 200 mg/g).

Bruges medicinblander iblandes den beregnede mængde pulver i en stamopløsning på det antal liter, der forventes forbrugt i løbet af 18 timer. Ny stamopløsning fremstilles hver dag.

Anvendes fodermedicinering, skal den beregnede døgndosis blot opblandes i den mængde foder, der forbruges til de dyr, der ønskes behandlet.

Overdosering

Ingen.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, adjuvanter eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes ved nedsat nyre- eller leverfunktion.

Produktet må ikke bruges samtidig med præparater, der indeholder jern.

Heste bør ikke behandles pga. påvirkning af tarmflora.

Drøvtyggende kvæg bør ikke behandles pga. påvirkning af vomflora.

Bivirkninger

Gastrointestinale forstyrrelser kan forekomme.

Kan give anledning til emaljehypoplasi og -misfarvning hos dyr, hvor mineraliseringen af tandanlægget ikke er afsluttet.

Interaktion

Tetracykliner udviser antagonisme over for antibiotika/kemoterapeutika med overvejende bactericid effekt, e.g. penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider.

Samtidig optagelse af fødeemner, herunder mælk og mælkeprodukter, eller behandling med præparater indeholdende store mængder calcium, magnesium, aluminium eller jernsulfat kan hæmme absorptionen af oralt indgivet tetracyklin pga. kompleksbinding.

Særlige advarsler

Antibiotika bør forbeholdes kliniske tilfælde som har responderet negativt, eller forventes at respondere negativt, på behandling med andre typer antibiotika inklusiv smalspektrerede antibiotika. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Bør kun med forsigtighed anvendes til dyr med nedsat nyre- eller leverfunktion. Bør ikke anvendes til neonatale hunde eller katte under 2 uger. Ved anvendelse af bredspektret antibiotika - som tetracykliner - er der altid risiko for superinfektion. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Ikke relevant.

Drægtighed og diegivning

Bør ikke anvendes til hundyr (hund og kat) i de sidste 2 uger af drægtigheden.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 30 døgn

Æg: 30 døgn

Pakningsstørrelse: 6 x 500 g.

Udleveringsgruppe: BPK

Pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zoetis Animal Health ApS, Øster Alle 48, 2100 København Ø.

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.