

Ecomectin Vet.

ivermectin 6 mg/g

oralt pulver til grise



Egenskaber

Ecomectin Vet. er godkendt til behandling af infektioner med endo- og ectoparasitter hos grise.

Ecomectin Vet. kræver ikke blandetilladelse.

Indikationer

Infektion med følgende parasitter hos grise:

Gastrointestinale rundorm

Ascaris suum (spolorm)

Hyostrogylus rubidus (rød maveorm)

Oesophagostomum spp. (knudeorm)

Strongyloides ransomi (trådorm)*

Lungeorm

Metastrongylus spp.

Lus

Haematopinus suis

Skabmider

Sarcoptes scabiei var. *Suis*

Dosering/indgivelse

16,7 mg Ecomectin Vet./kg dyr i 7 på hinanden følgende dage p.o. Et brev rækker til behandling af 19.940 kg dyr én dag.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 12 døgn

Pakningsstørrelse

333 g varmforsøglet alu-pose (Vnr 17 04 69)

*Når Ecomectin Vet. gives til drægtige søer inden faring, modvirker overførsel af *S. ransomi* via modermælk til pigtegrise.

Se bagsiden for mere information.



salfarm
www.salfarm.com

Antiparasitært

Ecomectin Vet.

indholdsstof styrkeivermectin 6 mg/g
oralt pulver til grise

Indikation

Behandling af infektioner med nematoder eller arthropoder forårsaget af:

Gastrointestinale rundorm: *Ascaris suum* (voksne og L4), *Hyostrongylus rubidus* (voksne og L4), *Oesophagostomum spp.* (voksne og L4), *Strongyloides ransomi* (voksne). Når lægemidlet gives til drægtige søer inden faring, modvirkes overførsel af *S.ransomi* via modermælk til pattegrise.

Lungeorm: *Metastrongylus spp.* (voksne).

Lus: *Haematopinus suis*.

Skabmider: *Sarcoptes scabiei* var. *Suis*.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ECO Animal Health Ltd., 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS, Storbritannien.

Dosering

16,7 mg Ecomectin Vet. pr. kg dyr pr. dag (0,1 mg ivermectin pr. kg dyr pr. dag) i 7 på hinanden følgende dage. Den mængde, der dagligt skal gives til individuelle grise, kan beregnes ved hjælp af følgende formel: 16,7 mg Ecomectin pr. kg dyr pr. dag ganget med den gennemsnitlige vægt (kg) af de dyr, der skal behandles. Et brev (333 g) rækker til behandling af 19.940 kg dyr én gang.

Overdosering

Givet i foderrationer til grise i mængder på op til 5 gange den anbefalede dosis på 0,1 mg ivermectin pr. kg kropsvægt i 21 på hinanden følgende dage (3 gange den anbefalede behandlingsperiode) forårsagede produktet ikke behandlingsrelaterede bivirkninger. Der er ikke fundet nogen antidot. Hvis der er mistanke om, at der forekommer bivirkninger, skal behandlingen seponeres, og passende symptomatisk behandling skal om nødvendigt iværksættes.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til andre arter end grise, da der kan forekomme alvorlige bivirkninger. **Der er bl.a. set dødsfald hos hunde.**

Bivirkninger

Ingen kendte.

Interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Hvis behandlede grise er i kontakt med inficerede dyr, forurenede bygninger, jord eller græsningsarealer, kan det resultere i reinfestation, og genbehandling kan være nødvendig. Da ivermectins effekt på skabmider ikke er øjeblikkelig, bør der ikke være direkte kontakt mellem behandlede og ubehandlede grise i mindst en uge efter afslutningen af behandlingen. Da luseæg ikke påvirkes af ivermectin, og da der kan gå op til tre uger, før de udklækkes, kan genbehandling være nødvendig. Undgå for hyppig og gentagen anvendelse af anthelmintika fra samme klasse over en længere periode samt underdosering. Anvendelse af produktet på en måde, der afviger fra de instruktioner, der gives i produktresuméet, kan medføre øget risiko for udvikling af resistens over for ivermectin.

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Avermectiner er muligvis ikke veltolererede af arter, de ikke er beregnede til. Der er rapporteret tilfælde af intolerance hos hunde, især collier, Old English Sheepdogs og beslægtede racer eller krydsninger samt hos hav- og landskildpadder.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:

Undgå at ryge, drikke eller spise under håndtering af produktet.

Vask hænder efter anvendelse. Blanding af produktet med foder skal foregå på et sted med god ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Kommer man ved et uheld i kontakt med produktet, skal kontaktområdet vaskes grundigt med rent, rindende vand. Hvis øjenirritation varer ved, skal der søges læge.

Drægtighed og diegivning

Produktet kan administreres til søer i alle stadier af drægtighed eller diegivning. Produktet kan anvendes til avlende dyr.

Tilbageholdelsestid

Grise: 12 dage

Pakningsstørrelse: 333 g pose – Må ikke opbevares over 25°C

Udleveringsgruppe: BP

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.