

Ecomectin® Vet.

ivermectin 10 mg/ml

injektionsvæske



Egenskaber

Ecomectin® Vet. er et ivermectin til injektion.

Ecomectin® Vet. er godkendt til behandling af infektioner med endo- og ektoparasitter.

Indikationer

Grise: Rundorm samt lungeorm, lus og skabmider.

Kvæg: Rundorm samt lungeorm, lus, skabmider og oksebremselarver.

Får: Rundorm samt lungeorm, skabmider og fårebremselarver.

Dosering/indgivelse

Grise: 1 ml/33 kg

Kvæg/får: 1 ml/50 kg

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Får og grise: 45 dage

Kvæg: 49 dage

Mælk: Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum.

Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet læmning/kælvning

Pakningsstørrelse

250 ml plasticflaske (Vnr 54 76 75) - kompatibel med Prima BMV automatsprøjten.

Se bagsiden for mere information.



salfarm
www.salfarm.com

Antiparasitært

Ecomectin® Vet.

ivermectin 10 mg/ml
injektionsvæske

Indikation

Grise: **Gastrointestinale rundorm:** *Ascaris suum* (voksne og L4), *Hyostrongylus rubidus* (voksne og L4), *Oesophagostomum* spp. (voksne og L4), *Strongyloides ransomi* (voksne) (ved behandling af søer 7-14 dage før faring med **Ecomectin® Vet.** injektionsvæske undgås infektion af smågrise med *Strongyloides ransomi* via mælk), *Trichuris suis* (voksne). **Lungeorm:** *Metastrongylus* spp. (voksne). **Nyreorm:** *Stephanurus dentatus* (voksne og L4). **Lus:** *Haematopinus suis*. **Skabmider:** *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

Kvæg: **Gastrointestinale rundorm** (voksne og umodne): *Ostertagia ostertagi* (inkl. inhiberende larver), *O. lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Coperia oncophora*, *C. punctata*, *C. pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helvetianus* (voksne), *N. spathiger* (voksne), *Strongyloides papillosus* (voksne), *Toxacara vitulorum* (voksne), *Trichuris* spp. (voksne). **Lungeorm** (voksne, umodne og inhiberende larver): *Dictyocaulus viviparus*. **Øjenorm:** *Thelazia* spp. (voksne). **Oksebremselarver:** *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*. **Lus:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus euryternus*, *Solenopotes capillatus*. **Skabmider:** *Psoroptes ovis* (syn *P. communis* var. *bovis*), *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*. Medvirker desuden ved bekæmpelsen af: **Bidende lus:** *Damalinia bovis*. og **Skabmider:** *Chorioptes bovis*. **Ecomectin® Vet.** injektionsvæske 10 mg/ml giver med den anbefalede dosering på 1 ml/50 kg legemsvægt til kvæg effektiv kontrol mod den store løbeorm (*Haemonchus placei*) og *Cooperia* spp. i op til 14 dage, den brune løbeorm (*Ostertagia ostertagi*) og knudeorm (*Oesophagostomum radiatum*) i op til 21 dage samt lungeorm (*Dictyocaulus viviparus*) i op til 28 dage efter behandlingen.

Får: **Gastrointestinale rundorm** (voksne og umodne): *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta* (inkl. inhiberende larver), *O. trifurcata*, *Trichostrongylus axei* (voksne), *T. colubriformis*, *T. vitrinus* (voksne), *Nematodirus filicollis*, *N. spathiger* (umodne), *Cooperia curticei*, *Oesophagostomum columbianum*, *O. venulosum* (voksne), *Chabatia ovina*, *Trichuris ovis* (voksne), *Strongyloides papillosus* (umodne), *Gaigeria pachyscelis*. **Lungeorm:** *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylus rufescens* (voksne). **Fårebremse-larver:** *Oestrus ovis*. **Skabmider:** *Psoroptes communis* var. *ovis* (mod behandling af fåreskab behandles 2 gange med 7 dages mellemrum. En injektion vil tydeligt reducere antallet af skabmider og ofte give indtryk af, at klinisk skab er elimineret), *Sarcoptes scabiei*, *Psorergates ovis*.

Dosering

Grise: 1 ml/33 kg lgv. (s.t. 0,3 mg ivermectin/kg lgv) SC.
Kvæg og får: 1 ml/50 kg lgv. (sv.t. 0,2 mg ivermectin/kg lgv) SC.
Brug af automatsprøjte anbefales.

Overdosering

Grise: Letargi, ataksi, bilateral mydriasis, periodisk skælven, åndedrætsbesvær og liggen på siden.
Ingen antidot.
Kvæg: Ataksi og depression.
Ingen antidot.
Får: Ingen.

Kontraindikationer

Må kun anvendes til subkutan injektion. Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Bivirkninger

Forbigående ubehag evt. hævelse på injektionsstedet er set.
Forsvinder uden behandling.

Interaktion

Ingen.

Særlige advarsler

Ofte og gentagende brug af den samme type anthelmintika igennem en længere tidsperiode samt underdosering bør undgås, da det kan medføre udviklingen af resistens. Mistanke om tilfælde af resistens undersøges ved hjælp af passende tests. Resistens overfor ivermectin er rapporteret i *Ostertagia circumcincta* i lam og i *Ostertagia ostertagi* hos kvæg i EU. Brug af dette produkt skal derfor baseres på lokal information om følsomhed. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Dette produkt er kun beregnet til grise, kvæg og får. Katte og hunde (specielt Collier, Old English Sheep-

dogs og beslægtede racer eller krydsninger) kan blive skadet af ivermectinindholdet i dette lægemiddel.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Ingen.

Drægtighed og diegivning

Kan anvendes. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Tilbageholdelsestid

Får og grise: Slagtning: 45 dage.

Kvæg: Slagtning: 49 dage.

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum.

Pakningsstørrelse: 1 x 250 ml

Udleveringsgruppe: BP

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ECO Animal Health Europe Ltd., 6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4 D04 TR29, Irland

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.