

Vominil®

maropitant 10 mg/ml
injektion, opløsning



Effektiv mod kvalme og opkastning

- Som en del af den præanæstetiske protokol fremmes patientens appetit og restitution efter operation og den opioid-fremkaldte kvalme mindskes^{1,2}
- Op til 99% af ejere foretrækker forebyggende tiltag mod kvalme¹
- Bred indikation
- Favorabel sikkerhedsprofil³
- Stor flaske (25 ml)



salfarm
www.salfarm.com

Doseringsanvisning

- 1 ml pr. 10 kg kropsvægt sc./iv.
– i op til 5 dage.
- Gives mindst en time inden forventet kvalme.
- Virkning i 24 timer
– kan med fordel gives aftenen før behandling, der forårsager kvalme
– f.eks. kemoterapi



Dyrearter

Hund og kat.

Indikation

Hund: Til behandling og forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi. Til forebyggelse af opkastning, undtagen opkastning forårsaget af transportsyge. Til behandling af opkastning i kombination med andre støttende foranstaltninger. Til forebyggelse af perioperativ kvalme og opkastning samt forbedring af restitution efter universel anæstesi ved anvendelse af μ -opiatreceptoragonisten morfin. **Kat:** Til forebyggelse af opkastning og reduktion af kvalme, undtagen hvis det er forårsaget af transportsyge. Til behandling af opkastning i kombination med andre støttende foranstaltninger.

Dosering

Indiceres subkutan eller intravenøst én gang dagligt ved en dosis på 1 mg/kg legemsvægt (1 ml/10 kg legemsvægt) i op til 5 på hinanden følgende dage. Intravenøs administration af veterinærlægemidlet skal gives som en enkelt bolus uden at blande veterinærlægemidlet med andre væsker. Legemsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt. For at forebygge opkastning skal veterinærlægemidlet administreres mere end 1 time i forvejen. Varigheden af virkning er ca. 24 timer, behandlingen kan derfor gives aftenen før administration af et middel, der kan fremkalde opkastning, f.eks. kemoterapi. Da den farmakokinetiske variation er stor, og maropitant akkumuleres i kroppen efter én gang dagligt gentaget administration, kan lavere doser end den anbefalede muligvis være tilstrækkelige hos nogle dyr, når dosen gentages.

Overdosering

Bortset fra forbigående reaktioner ved injektionsstedet efter subkutan injektion var maropitant veltolereret hos hunde og unge katte, der fik daglige injektioner med op til 5 mg/kg (5 gange den anbefalede dosis) i 15 på hinanden følgende dage (3 gange den anbefalede doseringsvarighed). Der foreligger ingen data om overdoser hos voksne katte.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof/hjælpestoffer.

Bivirkninger

Smerter på injektionsstedet, anafylaktisk reaktion, allergisk ødem, urticaria, erytem, kollaps, dyspnø, blege slimhinder, letargi, neurologiske forstyrrelser (f.eks. ataksi, krampeanfald, muskeltremor).

Interaktion

Bør ikke anvendes samtidigt med Ca-kanalantagonister. Binder stærkt til plasmaproteiner og kan konkurrere med andre stærkt bundne lægemidler.

Særlige advarsler

Opkastning kan være forbundet med alvorlige, stærkt svækkende tilstande, herunder blokeringer i mave-tarm-kanalen. Der bør derfor iværksættes passende diagnostiske evalueringer. God veterinærpraksis foreskriver, at antiemetika bør anvendes sammen med andre understøttende foranstaltninger, såsom fodringskontrol og væskeerstatningsterapi, sideløbende med behandling af de underliggende årsager til opkastningen. Det anbefales ikke at anvende veterinærlægemidlet mod opkastning som følge af transportsyge. **Hund:** Selvom det er påvist, at maropitant er effektiv til både behandling og forebyggelse af opkastning fremkaldt af kemoterapi, har det vist sig mest effektiv, hvis det anvendes forebyggende. Det anbefales derfor at administrere det antiemetiske middel før administration af det kemoterapeutiske middel. **Kat:** Maropitants reducerende virkning på kvalme er blevet vist i studier ved anvendelse af en model (xylazinfremkaldt kvalme). Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Sikkerhed er ikke blevet klarlagt hos hunde, der er under 8 uger gamle, eller hos katte, der er under 16 uger gamle, og hos drægtige eller diegivende hunde og katte. Maropitant metaboliseres i leveren og bør derfor anvendes med forsigtighed hos dyr med leversygdom. Da maropitant akkumuleres i kroppen i løbet af en 14 dages behandlingsperiode som følge af metabolisk mætning, bør der under langtidsbehandling implementeres nøje overvågning af leverfunktionen og eventuelle utilsigtede hændelser. Bør anvendes med forsigtighed hos dyr, der lider af eller er prædisponeret for hjertesygdomme. Der er observeret forlængelser på ca. 10 % af QT-intervallet på EKG i et studie med raske beaglehunde, der fik administreret 8 mg/kg oralt. Det er dog usandsynligt, at en sådan forlængelse har klinisk betydning. På grund af den hyppige forekomst af forbigående smerter ved subkutan injektion kan det være nødvendigt med foranstaltninger til fastholdelse af dyret. Hvis veterinærlægemidlet injiceres ved nedkølet temperatur, kan dette muligvis reducere smerter ved injektion. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Kan forårsage hudsensibilisering. Anvendes med forsigtighed ved overfølsomhed. Vask eksponeret hud med rigelige mængder vand umiddelbart efter kontakt. Ved udvikling af symptomer såsom udslet efter utilsigtet kontakt af produktet med huden, skal der søges lægehjælp – vis indlægssedlen. Kan være irriterende for øjnene. Undgå øjenkontakt. I tilfælde af utilsigtet kontakt af produktet med øjne skylles med rigelige mængder frisk vand. Ved symptomer skal der søges lægehjælp. Maropitant er en neurokinin-1 (NK1)-receptorantagonist, der virker i CNS. Utilsigtet selvinjektion eller indtagelse ved hændeligt uheld kan resultere i kvalme, svimmelhed og stærk søvnighed. Udvis forsigtighed for at undgå selvinjektion. I tilfælde af utilsigtet oral indtagelse eller selvinjektion skal der straks søges lægehjælp – vis indlægsseddel/etiket. Vask hænderne efter brug.

Drægtighed eller diegivning

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk-forholdet, da der ikke er udført konkluderende studier af reproduktionstoksikologi med nogen dyreart.

Pakningsstørrelse: 1 x 25 ml

Udleveringsgruppe: B

Pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Østrig.

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.

Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 7550 8080, Email: info@salfarm.com

Kilder:

¹ Hay Kraus (2017): Spotlight on the perioperative use of maropitant citrate.

² SPC Vominitil.

³ Tsukamoto et al. (2018): The anti-inflammatory action of maropitant in a mouse model of acute pancreatitis.