

Dormostop Vet.

atipamezolhydrochlorid 5 mg/ml
injektionsvæske, opløsning



Egenskaber

Dormostop Vet. er en potent og selektiv $\alpha 2$ -antagonist, som fremmer frigivelsen af neurotransmitteren nor-adrenalin i både det centrale og det perifere nervesystem. Dette medfører aktivering af centralnervesystemet på grund af sympatisk aktivitet.

Dormostop Vet. kan ophæve (eller hæmme) virkningerne af $\alpha 2$ -agonisterne medetomidin og dexmedetomidin.

Dyrearter

Hund, kat.

Indikationer

Ophævelse af den sedative effekt af medetomidin og dexmedetomidin.

Dosering/indgivelse

Administreres intramuskulært som enkeltdosis 15-60 minutter efter medetomidin eller dexmedetomidin.

Hund: Dosis i mikrogram er fem gange den tidligere medetomidindosis eller ti gange dexmedetomidindosis.

Se doseringseksempel nedenfor:

Dosis medetomidin- HCl 1 mg/ml	Dosis dexmedetomidin- HCl 0,5 mg/ml	Dosis dexmedetomidin- HCl 0,1 mg/ml	Dosis atipamezol- HCl 5 mg/ml
40 µg/kg	20 µg/kg	20 µg/kg	200 µg/kg
= 0,04 ml/kg	= 0,04 ml/kg	0,2 ml/mg	= 0,04 ml/kg

Kat: Dosis (i mikrogram) er 2½ gange den forudgående dosis af medetomidinhydrochlorid eller fem gange den forudgående dosis af dexmedetomidinhydrochlorid. Se doseringseksempel nedenfor:

Dosis medetomidin- HCl 1 mg/ml	Dosis dexmedetomidin- HCl 0,5 mg/ml	Dosis dexmedetomidin- HCl 0,1 mg/ml	Dosis atipamezol- HCl 5 mg/ml
80 µg/kg	40 µg/kg	40 µg/kg	200 µg/kg
= 0,08 ml/kg	= 0,08 ml/kg	0,4 ml/mg	= 0,04 ml/kg

Pakningsstørrelse

1 x 10 ml (Vnr 11 06 44)

Se bagsiden for mere information.



Dormostop Vet.

atipamezolhydrochlorid 5 mg/ml
injektionsvæske, opløsning

Indikation

Ophævelse af den sedative effekt af medetomidin og dexmedetomidin hos hund og kat.

Dosering

Hund: Dosen af intramuskulær atipamezolhydrochlorid (i µg) er fem gange den forudgående dosis af medetomidinhydrochlorid eller ti gange den forudgående dosis af dexmedetomidinhydrochlorid.

Kat: Dosen af intramuskulær atipamezolhydrochlorid (i µg) er 2½ gange den forudgående dosis af medetomidinhydrochlorid eller fem gange den forudgående dosis af dexmedetomidinhydrochlorid.

Overdosering

Forbigående takykardi og opskræmthed. Disse symptomer kan om nødvendigt ophæves ved hjælp af en dosis (dex)medetomidinhydrochlorid, der er lavere end den sædvanlige kliniske dosis. Hvis atipamezolhydrochlorid utilsigtet administreres til et dyr, der ikke forudgående er blevet behandlet med (dex)medetomidinhydrochlorid, kan der forekomme hyperaktivitet og muskelrystelser. Denne effekt kan vedvare i ca. 15 minutter. Opskræmtheden hos katten kan bedst håndteres ved at minimere eksterne stimuli.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof/hjælpestoffer. Dyr, der lider af lever- eller nyresygdomme.

Bivirkninger

Hyperaktivitet, takykardi, arytmier, øget sputsekretion, opkastning, diarré, ufrivillig afføring, atypisk vokalisering, muskelrystelser, øget vejrtrækningsfrekvens, ukontrolleret vandladning, sedation, hypotension.

Interaktion

Samtidig administration af atipamezol og andre centralt virkende lægemidler som diazepam, acepromazin eller opiater anbefales ikke.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Dyret bør have mulighed for at hvile sig et roligt sted. Kan medføre forbigående øget hjerterefrekvens. Hvis andre sedativa er indgivet, skal man være opmærksom på, at virkningerne af disse andre stoffer kan vare ved efter ophævelse af (dex)medetomidins effekt. Ophæver ikke effekten af ketamin, og må derfor ikke administreres inden for 30-40 minutter efter indgivelse af ketamin. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Kan forårsage irritation i huden, øjnene og slimhinderne. I tilfælde af utilsigtet eksponering af hud eller øjne skal huden og/eller øjnene skylles med vand. Søg lægehjælp, hvis irritationen vedvarer, og vis indlægssedlen. Kan forårsage adrenerg effekt. I tilfælde af selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen fremvises.

Drægtighed og diegivning

Sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt og anvendelse frarådes.

Pakningsstørrelse: 1 x 10 ml

Udleveringsgruppe: B

Pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9
3449 JA Woerden, Utrecht, Holland

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.