

Referencer:

1. Bonqat SPC
2. Mariti C, Guerrini F, Vallini V, et al. **The perception of cat stress by Italian owners.** J Vet Behav 2017; 20: 74-81.
3. Rodan I, Sundahl E, Carney H, et al. **AAFP and ISFM Feline-Friendly Handling Guidelines.** J Feline Med Surg 2011; 13: 364-375
4. Mariti C, Bowen JE, Campa S, et al. **Guardians' Perceptions of Cats' Welfare and Behavior Regarding Visiting Veterinary Clinics.** J Appl Anim Welf Sci 2016; 19: 375-84.
5. Volk JO, Felsted KE, Thomas JG, et al. **Executive summary of the Bayer veterinary care usage study.** JAVMA 2011; 238: 1275-82.
6. Mico JA and Prieto R. **Elucidating the mechanism of action of pregabalin: alpha(2)delta as a therapeutic target in anxiety.** CNS Drugs 2012; 26: 637-48.
7. Brocbrader HN, Radulovic LL, Posvar EL, et al. **Clinical pharmacokinetics of pregabalin in healthy volunteers.** J Clin Pharmacol 2010; 50: 941-50.
8. Adrian D, Papich MG, Baynes R, et al. **The pharmacokinetics of gabapentin in cats.** J Vet Intern Med. 2018; 32: 1996- 2002.

BONQAT 50 mg (Pregabalin), oral opløsning til katte.

Egenskaber: Pregabalin udøver sin effekt ved at binde på alpha2-delta protein på calciumkanaler i CNS. Dette nedsætter frigivelsen af forskellige neurotransmittere og genererer dermed en angstdæmpende effekt. **Indikation:** Dæmpning af akut angst og frygt i forbindelse med transport og dyrlægebesøg. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne. **Særlige forsigtighedsregler:** Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr; vurder altid kattens helbredsstatus før ordination. Sikkerheden er ikke undersøgt til katte, der vejer under 2 kg, eller som er under 5 mdr. gamle eller ældre end 15 år. Sikkerheden er ikke undersøgt på dyr med moderate eller alvorlige systemiske sygdomme, fx moderat til alvorlig nyre-, lever- eller kardiovaskulær sygdom. Må kun anvendes i henhold til den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk forholdet. Bonqat kan forårsage en let nedsat hjerterefrekvens, respirationssekvens og kropstemperatur. Behandlede dyr holdes varme. Overvåg katten nøje for symptomer på nedsat respirationsfrekvens og sedation, hvis der anvendes CNS-depressiva sideløbende med pregabalin. Hvis katten spytter en del af dosis ud, kaster op efter administration eller i tilfælde af hypersalivation må der ikke gives en ny dosis. Der kan forventes effekt i ca. 7 timer. Hvis katten virker sløv eller viser andre tegn på kraftig virkning efter administration, skal katten holdes indendørs og må ikke tilbydes vand eller foder, før den er helt restitueret. **Bivirkninger:** Tegn på sedation (kendetegnet ved sløvhed, påvirket proprioception og ataksi) og opkast er almindeligt forekommende i kliniske studier. Muskelsitren, udvidede pupiller, anoreksi, vægttab, salivation og leukopeni er sjældent rapporteret i kliniske studier. Disse bivirkninger er milde og forbigående. **Drægtighed og laktation:** Sikkerheden er ikke fastlagt hos avlsdyr eller ved drægtighed og laktation. Anvendes kun i henhold til dyrlægens vurdering af benefit-risk forholdet. **Interaktioner:** Brugen af andre CNS-depressiva forventes at forstærke virkningen af pregabalin, og derfor bør der foretages en passende justering af dosis. **Dosering:** Oral anvendelse. Administreres som en enkelt dosis på 5 mg/kg kropsvægt (0,1 ml/kg kropsvægt) cirka 1,5 time før start på transport/planlagt dyrlægebesøg. Kan administreres direkte gennem munden eller blandet med en lille mængde foder. En større mængde foder kan forsinke virkningstidspunktet. Anvend den medfølgende mundsprøjte. **Overdosering:** Se punkt 4.10 i SPC. **Pakning:** Glasflaske 1 x 2 ml. Opbevares i køleskab efter åbning. **Pris:** Se medicinpriser.dk. **Udleveringsgruppe:** B.

Teksten er omskrevet og forkortet i forhold til det seneste godkendte produktresumé (12-10-2021). Det fulde produktresumé kan rekvireres på www.orionvet.dk.
Markedsføringstilladelsen indehaves af Orion Corporation.



Angst hos kat kan blive et dyrevelfærdsproblem

Angst forhindrer mange katte i at blive transporteret til dyrlægen og modtage den regelmæssige sundhedsundersøgelse og -pleje, som enhver kat fortjener.

En undersøgelse konkluderer at:

59% af kattene viser tegn på stress under transport²
66% af kattene viser tegn på stress i forbindelse med dyrlægebesøg²

På klinikken kan faktorer som ukendte omgivelser og -mennesker, høje lyde eller uhensigtsmæssig håndtering forårsage frygtsomme reaktioner fra selv en rask kat³. I værste fald kan resultatet blive, at katten, ejer eller klinikpersonalet kommer til skade.⁴

HUSK:

Det er ikke kun katten, som finder det udfordrende at komme til dyrlægen; mange katteejere har den samme følelse.⁵

Ængstelsen forstærkes ved yderligere negative oplevelser⁴. Desuden viser en undersøgelse blandt katteejere, at katte ikke tilgiver så nemt⁵: Mange katte er reserverede og uvenlige flere dage efter et besøg på dyreklinikken.⁵



Orion Pharma Animal Health | Ørestads Boulevard 73 | 2300 København S
Tlf. 86 14 00 00 | orionvet@orionpharma.com | www.orionvet.dk

07/2022

ORION
PHARMA
ANIMAL HEALTH


The hiding is over

Bonqat[®]
Pregabalin

Det første registrerede lægemiddel til dæmpning af akut angst og frygt hos kat i forbindelse med transport og dyrlægebesøg

Det første lægemiddel der dæmper angst og frygt hos kat

- Dæmper akut angst og frygt forbundet med transport og dyrlægebesøg.
- Det aktive stof pregabalin mindsker frigivelsen af flere af de neurotransmittere, der er involveret i angstens patofysiologi.
- Dosis af Bonqat® er 5 mg/kg = 0,1 ml/kg.
- Hurtig indsættende effekt efter 1,5 time.
- Der kan forventes effekt i op til 7 timer, hvilket giver mulighed for at få katten tur-retur efter klinikbesøget.
- Transport og klinikbesøg bliver en mindre stressende oplevelse for katten, ejeren og dyrlægen.
- Muliggør en bedre, livslang dyrlægeomsorg og -pleje for katten.




Specielt designet til dine kattepatienter



Pregabalin dæmper angst hos katte

Pregabalin er en strukturel analog af neurotransmitter gamma-aminosmørsyre (GABA). Pregabalin binder til alfa-2-delta-underenheden af de spændingsstyrede calciumkanaler, som er placeret ved de presynaptiske ender af neuroner i hjernen og rygmærven. Herved mindskes frigivelsen af flere neurotransmittere (glutamat og monoaminerge neurotransmittere), der er involveret i angstens patofysiologi. Dette genererer den angst-dæmpende virkning og de tilknyttede adfærdsmæssige tegn.⁶

Virkningsmekanismen er lig gabapentins, men pregabalin er mere potent⁷, absorptionen er noget hurtigere og eliminationshalveringstiden længere hos katte.^{1,8}



Dosering



- Bonqat® indgives oralt som en enkelt dosis på **0.1 ml/kg (5 mg/kg)** cirka 1.5 time før start på transport eller planlagt dyrlægebesøg.
- Kan indgives enten direkte i munden eller blandet med lidt foder. En større mængde foder kan forsinke virkningstidspunktet.

Pakninger



- Bonqat® leveres i en glasflaske, der indeholder 2 ml af produktet, hvilket er 5 doser til en gennemsnitlig størrelse kat (4 kg).
- En 1 ml mundsprøjte medfølger i æsken for at lette administrationen af produktet.

Opbevaring og holdbarhed



- Efter åbning skal flasken opbevares i køleskab.
- Imidlertid kan produktet i kortere perioder (op til 1 måned i alt) opbevares ved stuetemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$).
- Holdbarhed under brug efter første aftagning af hæppen: 6 måneder.

