

Hvad skal jeg gøre når min kat er i behandling for hyperthyreoidisme?

Du skal:

- Tage katten med til regelmæssige kontrolbesøg hos dyrlægen. Følg dyrlægens anbefaling.
- Straks kontakte dyrlægen, hvis din kat holder op med at spise eller får det dårligt, mens den er i medicinsk behandling.
- Vaske hænder med vand og sæbe, når du har brugt lægemidlet, eller når du har været i kontakt med kattens opkast eller bakke.
- Bruge non-permeable engangshandsker når du håndterer veterinærlægemidlet eller de behandlede dyrs opkast eller brugte kattegrus, hvis du er kvinde i den fødedygtige alder eller ammer.

Du må ikke:

- Ændre dosis uden at spørge dyrlægen til råds først.
- Spise, drikke eller ryge, mens du håndterer medicinen eller kattebakken.
- Hvis du er, tror du er eller forsøger at blive gravid, bør du ikke administrere veterinærlægemidlet eller håndtere behandlede kattes opkast/kattegrus.

Yderligere oplysninger kan fås hos din dyrlæge.

Din kat har fået ordineret følgende behandling af din dyrlæge:

☐ Tabletter (Thiamazol)

___: 1,25 mg ___: 2,5 mg ___: 5 mg

Gives følgende dosis: _____mg/dag.

Hvor det er muligt skal den daglige dosis opdeles i to og indgives morgen og aften.

☐ Oral opløsning (Thiamazol)

Gives følgende dosis: _____mg/dag.

Hvis muligt, bør den daglige dosis deles i to lige store doser og indgives morgen og aften.

Anvend den medfølgende doseringssprøjte, som er inddelt i mg fra 0,25 mg til 5 mg.

Gives direkte i kattens mund.

Næste kontrol og/eller blodprøve: _____

Andre kommentarer: _____

For mere information se:

www.hyperthyreoidismehoskat.dk



Et liv med hyperthyreoidisme.

Hyperthyreoidisme ændrer din kat...
Du kan få din kat tilbage...



Dyrlægestempel:

Dechra Veterinary Products
Mekuvej 9 · DK-7171 Uldum
Tlf. 76 90 11 00 kundeservice@dechra.com
www.dechra.dk Oktober 2025

Hyperthyreoidisme Brochyr DK 2025 Ver 2



Din kat, hyperthyreoidisme og dig

Din kat er blevet diagnosticeret med hyperthyreoidisme.

Denne folder er ment som en hjælp til at besvare nogle af de spørgsmål du må have i forbindelse med hyperthyreoidisme og behandlingen heraf.

Katte med hyperthyreoidisme kan få det bedre, og gennem daglig medicinering og jævnlig kontrol hos dyrlægen vil symptomerne på din kats hyperthyreoidisme forsvinde, og din kat vil kunne leve et godt liv.

Hvad er hyperthyreoidisme?

Hyperthyreoidisme opstår når skjoldbruskkirtlen danner for mange hormoner.

Disse hormoner:

- Er nødvendige for at kroppens celler kan vokse og udvikle sig, og dermed udføre de vigtige funktioner de har i kroppen.
- Hjælper med til at regulere cellernes omsætning af proteiner, fedt og kulhydrater.
- Er med til at regulere kropstemperaturen og iltforbruget og dermed også en lang række stofskifteprocesser.

Når der dannes for mange skjoldbruskkirtelhormoner, påvirker det derfor stort set alle organsystemer.

Hvad er årsagerne til hyperthyreoidisme?

- Årsagerne til hyperthyreoidisme er endnu ikke fuldt forstået.
- I 98 % af tilfældene er forstørrelsen af skjoldbruskkirtlen godartet, og i disse tilfælde kan der nemt stilles en diagnose og igangsættes en effektiv behandling.

Sådan genkender du tegnene på hyperthyreoidisme

Hyperthyreoidisme ses oftest hos ældre katte.

Symptomer på hyperthyroidisme kan være:

- Vægttab på trods af stor appetit er det mest almindelige sygdomstegn
- Rastløshed, irritabilitet og hurtig hjerterefrekvens.
- Forøget væskeindtag og urinering
- Usoigneret pels
- Diarre og lejlighedsvis opkastning.

Ikke alle katte reagerer ens på denne sygdom, og det er ikke sikkert, at din kat udviser alle disse tegn. Det er altid en god idé at du i videst muligt omfang holder øje med ændringer i din kats vaner, opførsel og udseende.

Sådan stilles diagnosen hyperthyreoidisme

Fysisk undersøgelse:

I mange tilfælde vil dyrlægen kunne mærke den forstørrede skjoldbruskkirtel på kattens hals.

Diagnostiske test

For at få diagnosen bekræftet, vil dyrlægen tage en blodprøve, der måler indholdet af T4-hormon.

Da de fleste katte med hyperthyreoidisme er ældre, anbefales det, at dyrlægen også tager andre blodprøver for at vurdere, hvordan resten af kattens organer fungerer, og for at sikre sig, at den ikke har andre helbredsproblemer. Det er vigtigt, fordi andre sygdomme kan gøre behandlingen af hyperthyreoidisme mindre effektiv.



Medicinsk behandling af hyperthyreoidisme hos katte

Medicinsk behandling

Der findes veterinære lægemidler til medicinsk behandling af hyperthyreoidisme hos katte. Behandlingen vil sænke niveauet af T4 og T3 i blodet til det normale niveau.

Stabilisering

For at stabilisere din kats tilstand, vil dyrlægen almindeligvis ordinere et lægemiddel i tre uger til at starte med. Derefter vil dyrlægen vurdere og overvåge din kats respons på behandlingen og overveje den mest velegnede langvarige behandling til din kat.

Langvarig medicinsk behandling

Lægemidlet, der indeholder det aktive stof, thiamazol, skal gives til din kat hver dag for at nedsætte overproduktionen af skjoldbruskkirtelhormoner.

Behandlingen vil lindre de ydre symptomer på hyperthyreoidisme så længe din kat er i behandling, men det kurerer ikke sygdommen, og din kat vil have brug for medicin resten af dens liv.

Det er vigtigt, at din kats tilstand overvåges ved regelmæssige blodprøver og dyrlægekontroller. Både for at sikre at din kat får den rette dosis af medicin samt følge din kats generelle sundhedstilstand.