

# Zitch Vet.

permethrin 40 mg/ml  
pour-on, opløsning



## Egenskaber

Permethrin tilhører type I-klassen af pyrethroider med repellerende virkning. Pyrethroider påvirker natrium-kanalen ved at hæmme såvel aktiverings- som inaktiveringsegenskaberne og medfører dermed hyper-excitabilitet og død hos parasitten.

## Dyrearter

Hest og æsel.

## Indikationer

Hjælpemiddel til kontrol af sommereksem i kraft af dets afvisende virkning på det bidende insekt *Culicoides* spp.

## Dosering

1,0 ml pr. 10 kg kropsvægt. Højest 40 ml.

Påfør den afmålte dosis i ca. lige dele på manen og bagdelen. Undgå saddeleområdet. Behandling en gang ugentlig skulle være tilstrækkeligt for de fleste heste og æsler.

Hvis heste og æsler skal strigles, så påføres Zitch Vet. efterfølgende.

### Doseringsvejledning

| Kropsvægt (kg)    | 100 | 200 | 250 | 300 | >400 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Dosisvolumen (ml) | 10  | 20  | 25  | 30  | 40   |

## Tilbageholdelsestider

Ikke godkendt til brug til heste eller æsler, der er bestemt til menneskeføde.

## Pakningsstørrelse

1 x 250 ml (Vnr 49 58 98)

Se bagsiden for mere information.



# Zitch Vet.

permethrin 40 mg/ml  
pour-on, opløsning

## Lægemiddelform

Pour-on, opløsning.

## Dyreart

Hest og æsel.

## Indikationer

Hjælpe middel til kontrol af sommereksem i kraft af dets afvisende virkning på det bidende insekt *Culicoides* spp.

## Dosering

4 mg/kg kropsvægt, svarende til 1,0 ml pr. 10 kg kropsvægt indtil højst 40 ml. Se skema. Påfør den afmålte dosis i ca. lige dele på manen og bagdelen, idet saddelemrådet undgås. Behandlingen bør påbegyndes ved begyndelsen af sæsonen for sommereksem. Behandling en gang ugentlig skulle være tilstrækkeligt for de fleste heste og æsler. Hvis heste og æsler skal strigles, påføres veterinærlægemidlet efter strigling.

## Overdosering

Tremor, hyperexcitabilitet, savlen, koreoatetose og paralyse. Tegnene forsvinder hurtigt, og dyrene bedres sædvanligvis indenfor en uge. Der findes ingen specifik modgift, men symptomatisk behandling kan gives.

## Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Må ikke anvendes til dyr, der lider af leversygdom. Må ikke anvendes til katte.

## Bivirkninger

Reaktion på påføringsstedet, irritation på påføringsstedet, hårtab/alopeci på påføringsstedet. Nogle få heste, især de tyndhudede araberheste, kan udvise tegn på hudirritation eller overfølsomhed over for behandling med veterinærlægemidlet. Hos sådanne individer anbefales en lille tolerance test nederst på halsen (se "Særlige forholdsregler").

## Interaktioner

Der bør udvises forsigtighed ved påføring af veterinærlægemidlet, da det kan påvirke visse plastikprodukter negativt. Veterinærlægemidlet kan forlænge virkningen af barbiturater.

## Særlige forholdsregler

Særlige forholdsregler vedrørende sikker brug hos de dyrearter, som lægemidlet er beregnet til: Kun til udvortes brug. Veterinærlægemidlet må ikke påføres længere frem end ørerne. Vær omhyggelig med at undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af sprøjt i dyrets øje ved et uheld skal det berørte øje med det samme skylles grundigt med rigelige mængder rent vand, og dyrlægen tilkaldes. Sadelområdet må ikke behandles. Procedure for test af tolerance: Ved brug af beskyttelseshandsker påføres en lille mængde af veterinærlægemidlet (cirka 1 ml) på et identificerbart område nederst på dyrets hals og gnides ind i huden med et stykke gaze. Det brugte stykke gaze krænges ned i handsken og bortskaffes sikkert. 24 og 48 timer efter påføring undersøges området, hvor veterinærlægemidlet blev påført, og huden observeres for tegn på reaktion (rødme, hævelse, afskalning eller udsondring). Hvis der forekommer en reaktion efter tolerancetesten, må veterinærlægemidlet ikke anvendes på dyret. Hvis der skulle forekomme bivirkninger, bør behandlingen straks stoppes. En eventuel resulterende hudreaktion er kortvarig. Særlige forholdsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet til dyr: Veterinærlægemidlet kan forårsage neurotoksiske virkninger og irritation af hud og øjne. Der skal anvendes personlige værnemidler bestående af beskyttelsesbeklædning, beskyttelseshandsker og kemikalieresistente handsker, såsom gummi, PVC eller nitril, ved håndtering af veterinærlægemidlet. I tilfælde af spild ved et uheld på huden eller i øjnene skal der straks skylles med vand. Vask hænder efter brugen. Anvendes i et velventileret område. Sørg for, at det behandlede område er tørt, inden hudkontakt med det behandlede dyr tillades. I tilfælde af eksponering ved et uheld søges straks lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen. Opbevares væk fra mad, drikkevarer og dyrefoder. Personer med kendt overfølsomhed over for permethrin bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet. Særlige forholdsregler vedrørende beskyttelse af miljøet: Veterinærlægemidlet kan have en negativ indvirkning på vandlevende organismer og bier. Undgå at forurene damme, vandløb eller grøfter med produktet eller den brugte beholder.

## Særlige advarsler

Sommereksem menes at skyldes overfølsomhed over for bid fra flyvende insekter, f.eks. *Culicoides*-arter. Udover behandling bør der træffes andre foranstaltninger for at reducere eksponeringen for sådanne insekter, hvor det er praktisk muligt. Det kan være relevant for ejeren at søge dyrlægerådgivning om behandling af heste med sommereksem. Det anbefales også, at ejeren søger dyrlægerådgivning ved svære tilfælde af sommereksem og ved tilfælde af sommereksem, der ikke responderer på behandling. Vask eller eksponering for regn efter påføring af veterinærlægemidlet kan påvirke beskyttelsen. Unødigt anvendelse af antiparasitiske lægemidler eller anvendelse, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet, kan øge selektionstrykket for resistens og medføre nedsat effekt. Beslutningen om at anvende produktet bør baseres på bekræftelse af parasitart og -belastning eller på risikoen for infestation baseret på dens epidemiologiske egenskaber for hvert enkelt dyr.

## Drægtighed og diegivning

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

## Tilbageholdelsestid

Ikke godkendt til brug til heste eller æsler, der er bestemt til menneskeføde.

## Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevares i den originale beholder. Hold flasken tæt tillukket, og opbevar den et tørt sted for at beskytte mod fugt. Opbevar flasken i den ydre æske for at beskytte mod lys.

## Pakninger

1 x 250 ml

## Udleveringsgruppe

B

## Pris

For dagsaktuel pris se [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk)

## Indehaver af markedsføringstilladelsen

Floris Veterinaire Produkten BV, Kempenlandstraat 33 / 35, 5262 GK Vught, Holland

Fuldstændigt produktresumé kan ses på [www.produktresume.dk](http://www.produktresume.dk) eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: [info@salfarm.com](mailto:info@salfarm.com)

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.