


Hvordan påføres salven?



Trin 1:

Tag vandtætte handske på.

Trin 2:

Drej hæften mod uret for at åbne tuben.

Trin 3:

Tryk jævnt, men forsigtigt, på forsigtigt, på gubbe salven kommer 3,8 cm salve ud på din pegefing; brug målestregen på emballagen eller i indlægssedlen til at måle.

Trin 4:

Brug fingeren til forsigtigt at gnubbe salven ind på den indvendige side af kattens ydre øre, idet salven fordeles jævnt på overfladen. Hvis salven kommer i kontakt med din hud, skal huden vaskes med vand og sæbe.

Linjen nedenfor svarer til den streg salve, der skal påføres:

Mirataz. 20 mg/g transdermal salve. **Aktivt stof:** Mirtazapin 2mg. **Rx. ATCvet-kod:** QN06AX11. **Dyrearter:** Katte **Indikationer:** Til forebyggelse af kropsvægttab hos katte, der lider af ringe appetit og vægttab som følge af kroniske sygdomme. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes til dyr, der er under 7,5 måneder gamle, eller som vejer under 2 kg. Bør ikke anvendes til katte, der behandles med cyproheptadin, tramadol eller monoaminoxidasehæmmere (MAOI'er), eller som har været behandlet med en MAOI inden for de seneste 14 dage for behandling med dette veterinærlægemiddel, da der kan være en øget risiko for serotonin syndrom. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Virkningen af veterinærlægemidlet er ikke klarlagt hos katte under 3 år. Virkningen og sikkerheden ved veterinærlægemidlet er ikke klarlagt hos katte med svær yresygdom og/eller neoplas. Behandlingen med mirtazapin bør ikke erstatte nødvendig diagnosticering og/eller behandlingsregimer, som er påkrævet for at behandle den eller de underliggende sygdomme, der forårsager det uønskede vægttab. Veterinærlægemidlet bør ikke anvendes på beskadiget hud. I tilfælde af leversygdom kan der forekomme forhøjede leverenzym. Nyrer sygdom kan medføre reduceret clearance af mirtazapin, hvilket kan medføre højere eksponering for lægemidlet. Virkningen af mirtazapin på regulering af blodsukkeret er ikke undersøgt. Ved brug hos katte med nedsat blodvolumen bør understøttende behandling (væsketerapi) iværksættes. Der bør udvises forsigtighed, så andre dyr i husholdningen ikke kommer i kontakt med påføringsstedet, før det er tort. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Produktet kan absorberes kutant eller oralt og kan forårsage sløvhed eller sedation. Undgå kontakt med det behandlede dyr i de første 12 timer efter den daglige påføring, og indtil påføringsstedet er tort. Det anbefales derfor at behandle dyret om aftenen. Vandtætte beskyttelseshandsker til engangsbrug skal anvendes ved håndtering og påføring af veterinærlægemidlet. Vask hænderne grundigt umiddelbart efter påføring af veterinærlægemidlet eller i tilfælde af, at huden kommer i kontakt med produktet eller den behandlede kat. Da gravide kvinder anses som en mere følsom population, anbefales gravide og kvinder, der forsøger at blive gravide, at undgå håndtering af produktet og at undgå kontakt med behandlede dyr i hele behandlingsperioden. Efterlad ikke tuben udenfor beholderen, bortset fra ved påføring. Børn må ikke være til stede, når produktet smøres på katten. **Bivirkninger:** Reaktionen på påføringsstedet (erytem, skorpedannelse, rester, afskalning/tørhed, flagedannelse, rysten på hovedet, dermatitis eller irritation, hårtab og kløe) og adfærdssændringer (øget vokalisering, hyperaktivitet, desorientering eller ataksi, letargi/svagthed, opmærksomhedssøgende og aggressiv adfærd) var meget almindelige i sikkerhedsstudier og kliniske studier. Opkastning, polyuri forbundet med reduceret vægtylde i urin, forhøjet karbamid og dehydrering var almindeligt forekommende i sikkerhedsstudier og kliniske studier. Afhængigt af sværhedsgraden af opkastning, dehydrering eller adfærdsmæssige ændringer kan anvendelsen af produktet seponeres efter dyrlægens vurdering af benefit/risk-forholdet. Disse bivirkninger, inklusive lokale reaktioner, forsvandt ved slutningen af behandlingsperioden uden specifik behandling. **Drægtighed, diegivning eller æglægning:** Bør ikke anvendes til katte, der skal bruges til avl, er drægtige eller diegivende. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Bør ikke anvendes til katte, der behandles med cyproheptadin, tramadol eller monoaminoxidasehæmmere (MAOI'er), eller som har været behandlet med en MAOI inden for de seneste 14 dage for behandling med dette veterinærlægemiddel, da der kan være en øget risiko for serotonin syndrom. Mirtazapin kan øge de sedative egenskaber ved benzodiazepiner og andre stoffer med sedative egenskaber. **Dosering og indgivelsesmåde:** Transdermal anvendelse. Veterinærlægemidlet påføres topisk på den indvendige side af det ydre øre én gang dagligt i 14 dage med en dosis på 0,1 g salve/kat (2 mg mirtazapin/kat). Det svarer til en streg salve på 3,8 cm. Skift hver dag mellem højre og venstre øre. Den indvendige side af kattens øre kan eventuelt rengøres med en tør serviet eller klud umiddelbart før den næste planlagte dosis. Hvis du glemmer at give en dosis, skal du vente til næste dag med at genoptage den daglige dosering. Den anbefalede faste dosis er testet hos katte med en vægt på mellem 2,1 kg og 7,0 kg. De kendte symptomer på en overdosis mirtazapin på > 2,5 mg/kg hos katte omfatter: vokalisering og adfærdssændringer, opkastning, koordinationsbesvær, rastløshed og rysten. I tilfælde af en overdosis bør symptomatisk/understøttende behandling om nødvendigt iværksættes. I tilfælde af en overdosis er der observeret samme bivirkninger som ved den anbefalede terapeutiske dosis, men med en højere forekomst. **Pakningsstørrelser:** 3 gram tube af polyethylenlaminat med et børnesikret skruelåg. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Regulatory B.V. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for ændring af teksten:** 15/07/2025 **Udleveringsbestemmelse:** B. Ovenstående tekst er et forkortet resumé af sammendraget af produkt egenskaber. For yderligere information se venligst på www.vetisearch.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.vetisearch.dk.

MIRATAZ_PO_DK_2025_VER 1



Ufrivillig vægttab hos katten – vejledning til at støtte appetitten derhjemme



Informationsbrochure til dyreejeren



Et utilsigtet vægttab skal altid tages alvorligt

En ændring i din katts kropsvægt kan have flere forskellige årsager, og det er ikke altid lige let at identificere, hvad vægtændringen skyldes. Det kan være det første symptom på sygdom, såsom en overaktiv skjoldbruskkirtel, kronisk nyresygdom eller inflammatorisk tarmsygdom.

Længerevarende utilstrækkelig ernæring kan være mere skadelig for din kat end den underliggende årsag til kattens vægttab.


Du kan hjælpe med at identificere tidlige tegn på vægttab derhjemme

Hold øje med kattens spisevaner:

- Har katten den samme interesse for mad, som den plejer at have.
- Spiser katten den korrekte mængde mad.
- Hvor lang tid tager det for katten at spise op.

Når du kæler og ær din kat, skal du lægge mærke til forandringer i kattens kropsbygning:

- Om ribbene tydeligere kan mærkes, eller rygknoglerne er mere fremtrædende.
- Buler eller hævelser.
- Områder, der virker ømme.



Medicinsk behandling


Din dyrlæge har ordineret Mirataz-salve til din kat. Mirataz hjælper med at øge vægten hos katte, hvis nedsatte appetit og vægttab skyldes kroniske sygdomme.

Det støtter kattens appetit, samtidig med at din dyrlæge undersøger årsagen til vægttabet. Forandringen kan normalt ses inden for 14 dage.

Instruktioner for anvendelse

- Brug altid engangshandsker, og vask hænderne grundigt efter hver påføring.
- Opbevar altid tuben i yderemballagen mellem påføringerne. Tuben har børnesikret skruelåg.
- Salven påføres på indersiden af kattens ydre øre; hver anden dag i venstre øre og hver anden dag i højre øre.
- Efter påføring, skal du sørge for, at både mennesker og dyr, der er i kontakt med katten, ikke rører ved kattens øre i de første 12 timer efter påføringen. Salven kan både optages gennem munden og gennem huden.
- Katten bør ikke sove sammen med ejeren under hele behandlingen.
- Det kan være lettere at påføre salven om morgenen, inden du tager på arbejde, eller om aftenen inden du går i seng.
- Hvis du glemmer en dosis, skal du påføre dosen den næste dag, som du plejer.
- Hold øje med, hvor meget katten spiser, når du stopper med at bruge salven, og observer hvis den spiser mindre. Hvis kattens appetit fortsat er nedsat efter 48 timer, skal du kontakte din praktiserende dyrlæge.

Salven er appetitstimulerende, som påføres på indersiden af kattens ydre øre, og som optages gennem huden.



Behandlingsdagbog

Salven påføres på den indvendige side af kattens ydre øre: hver anden dag i venstre øre og hver anden dag i højre øre. Brug skemaet herunder til at holde styr på hvilket øre, der senest er anvendt til påføring af lægemidlet.

Bedøm kattens appetit ved hjælp af stjernerne:

1 stjerne = vil slet ikke spise, 5 stjerner = normal appetit.

Uge 1	Venstre øre	Højre øre	Appetit				
Mandag	☒	☐	★	★	★	★	★
Tirsdag	☐	☐	★	★	★	★	★
Onsdag	☐	☐	★	★	★	★	★
Torsdag	☐	☐	★	★	★	★	★
Fredag	☐	☐	★	★	★	★	★
Lørdag	☐	☐	★	★	★	★	★
Søndag	☐	☐	★	★	★	★	★

Uge 2	Venstre øre	Højre øre	Appetit				
Mandag	☐	☐	★	★	★	★	★
Tirsdag	☐	☐	★	★	★	★	★
Onsdag	☐	☐	★	★	★	★	★
Torsdag	☐	☐	★	★	★	★	★
Fredag	☐	☐	★	★	★	★	★
Lørdag	☐	☐	★	★	★	★	★
Søndag	☐	☐	★	★	★	★	★

Hvis du er bekymret for din katts helbred under behandlingen, skal du kontakte din praktiserende dyrlæge.